



Patsiendi andmed

Eesnimi
Perekonnanimi

Tel:

Kontaktandmed hädaolukorraks

Eesnimi
Perekonnanimi

Tel:

Arsti kontaktandmed

Eesnimi
Perekonnanimi

Tel:

Address:

Patsiendi hoiatuskaart BCG-medac'i kohta

(BCG – *Bacillus
Calmette Guérin*)

medac

TÄHTIS TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

Sellel patsiendil ravitakse/raviti põievähki BCG-medac'iga. BCG-medac võib põhjustada süsteemseid infektsioone, mis võivad lõppeda surmaga, kui neid asjakohaselt ei ravita.

BCG sisaldab *Mycobacterium bovis*'est valmistatud vähese nakatamisvõimega elusate bakterite *Bacillus Calmette-Guérin* lüofiliseeritud suspensiooni. See tüvi ei ole virulentne. Seetõttu ei ole vaja patsienti isoleerida.

Süsteemsed BCG-infektsioonid võivad tekkida ka aastaid pärast viimase annuse manustamist intravesikaalse instillatsioonina. Need infektsioonid võivad avalduda palaviku, öise higistamise, kehakaalu languse, kopsu- või maksagranuloomi, konjunktiviidi või Reiteri sündroomina, abstsesside, infitseerunud aneurüsmide, implantaadi või siiriku infektsioonina ka ümbritsevates kudedes. Selle infektsiooni võimalike tagajärgede vähendamiseks on oluline see varakult diagnoosida ja asjakohaselt ravida.

Pange tähele, et mükobakterite uuringu negatiivne tulemus ei välista süsteemset BCG-infektsiooni, olenemata kasutatud proovist (veri, uriin, seerum). Mitmel juhul on olnud vere/uriini kultuur negatiivne, kuigi patsiendil oli süsteemne BCG-infektsioon.

BCG-infektsiooni kahtluse korral on olemas ravi kliinilistest sümptomitest ja nende raskusest.

Lisateabe saamiseks lugege kehtivat ravimi omaduste kokkuvõtet. Soovitatav on konsulteerida nakkushaiguste eriarstiga.

Palun teatage võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

TÄHTIS

See kaart sisaldab tähtsat ohutusteavet, mida peate teadma ravi ajal BCG-medac'iga ja pärast ravi. Kandke seda kaarti endaga kaasas ja näidake seda kõigile tervishoiutöötajatele, kes teid ravivad lisaks ravi määranud uroloogile. Hoidke seda kaarti käepärast ka pärast ravi lõpetamist BCG-medac'iga!

BCG-medac'i kõrvaltoimed võivad tekkida mis tahes ajal ravi vältel, ka aastaid pärast teie ravi lõpetamist. Diagnoosituna on need ravitavad.

Õelge oma arstile, kui teil tekib mis tahes teisi võimalikke sümptomeid, mida ei ole sellel kaardil loetletud, kuid mis valmistavad teile muret.

Ärge püüdke oma sümptomeid ise teiste ravimitega ravida.

Ravi BCG-medac'iga võib põhjustada kõrvaltoimena süsteemse infektsiooni tekkimist. See infektsioon võib tekkida igal ajal – ka aastaid pärast viimast instillatsiooni. Diagnoositud infektsioon on siiski ravitav.

Nn BCG-hilisinfektsiooni tunnuseid ja sümptomeid on vahel raske ära tunda, sest need võivad sarnaneda teistele haigustele.

Need põievälise BCG-infektsiooni tunnused ja sümptomid võivad olla

- palavik üle 39,5 °C vähemalt 12 tunni jooksul või nädalaid kestev palavik üle 38 °C, öine higistamine;
- kaalulangus teadmata põhjusel;
- üha halvenev enesetunne;

- põletikutunnused, mis võivad erineda ja avalduda
 - hingamisraskuste või kõhana, mis ei tundu tavalise külmetusena;
 - maksahäiretena: survetundena paremal pool ülakõhus või maksatalitluse laboratoorsete näitajate (eelkõige ensüümi aluselise fosfataasi) kõrvalekalletena või
 - silmade valu ja punetusena, nägemishäirete või nägemise hägustumisena; silma sidekesta põletikuna;
- nn granulomatoosse põletikuna, mis ilmneb koeproovi uuringus.

Kui teil tekib kaks või rohkem eespool loetletud kõrvaltoimet, peate pöörduma haiglasse või konsulteerima oma perearsti või urooloogiga, isegi kui teie põievähki on ammu ravitud.

- Haiglasse minnes võtke kaasa see kaart ja oma ravimite, sealhulgas retsepti- ja käsimüügiravimite, vitamiinide ning taimsete toidulisandite täielik loetelu;
- õelge arstidele ja/või medõdedele, et teid on ravitud/ravitakse BCG-ga, ja näidake neile seda kaarti, et nad teaksid, kuidas teid ravida.

Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.