

Potilaan muistutuskortti

Tämä muistutuskortti sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa, josta sinun tulee olla tietoinen ennen syöpään liittyviin sairauksiin annettavaa Tsoledronihappo medac -hoitoa, sekä myös hoidon aikana.

Lääkäri on suositellut sinulle Tsoledronihappo medac -valmistetta luumetastaasien aiheuttamien luustokomplikaatioiden (esim. murtumien) ehkäisyyn tai vähentämään kalsiumin määrää veressä aikuispotilailla, kun se on liian suuri kasvaimen vuoksi.

Leuan osteonekroosiksi (ONJ) (leuan luuvaurio) kutsuttua haittavaikutusta on raportoitu melko harvinaisissa tapauksissa kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen potilailla, jotka saavat tsoledronihappo -hoitoa syöpään liittyviin sairauksiin. Leuan osteonekroosi voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Noudata seuraavia varotoimia osteonekroosin riskin pienentämiseksi:

Ennen hoidon aloittamista:

- Pyydä lääkäriä kertomaan sinulle leuan osteonekroosista ennen kuin aloitat hoidon.
- Tarkista lääkäriltä, suositellaanko sinulle hammastarkastusta ennen Tsoledronihappo medac -hoidon aloittamista.
- Kerro lääkärille/sairaanhoitajalle (terveydenhuollon ammattilaiselle), jos sinulla on suuhun tai hampaisiin liittyviä vaivoja.

Leuan osteonekroosin riski saattaa olla suurempi potilailla, joille tehdään hammasleikkaus (esim. hampaanpoistot), jotka eivät saa säännöllistä hammashoitoa tai joilla on iensairaus, jotka tupakoivat, jotka saavat erityyppisiä syöpähoitoja tai jotka ovat aiemmin saaneet bisfosfonaattihoidon (käytetään luusairauksien hoitoon tai ehkäisyyn).

Hoidon aikana:

- Noudata hyvää suuhygieniaa. Varmista, että mahdolliset hammasproteesit istuvat hyvin ja käy säännöllisissä hammastarkastuksissa.
- Jos hampaitasi hoidetaan tai olet menossa hammasleikkaukseen (esim. hampaanpoistot), kerro siitä lääkärille, ja kerro hammaslääkärille, että saat Tsoledronihappo medac -hoitoa.
- Ota heti yhteys lääkäriin ja hammaslääkärin, jos sinulla esiintyy suun tai hampaiden oireita, kuten hampaiden löystymistä, kipua, turvotusta, huonosti paranevia haavaumia tai vuotoa, sillä ne saattavat olla merkkejä leuan osteonekroosista.

Lue lisätietoja pakkausselosteesta.