

Upplýsingar um sjúkling

Eiginnafn

Eftirnafn

Sími

Tengiliður við neyðaraðstæður

Eiginnafn

Eftirnafn

Sími

Tengiliðaupplýsingar læknis

Nafn læknis

Sími

Netfang

Heimilisfang

Öryggisspjald
fyrir sjúklinga vegna

BCG-medac

(BCG - Bacillus
Calmette Guérin)

medac

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR ÆTLAÐAR HEILBRIGÐISSTARFSMÖNNUM

Pessi sjúklingur fær/hefur fengið meðferð með BCG-medac við krabbameini í þvagblöðru. BCG-medac getur valdið altækum sýkingum sem geta reynst banvænar ef þær eru ekki meðhöndlaðar á viðunandi hátt.

BCG inniheldur lifandi *Bacillus Calmette-Guérin* bakteríur í formi frostþurrkaðrar dreifu með lítinn sýkingarmátt, sem fengnar eru úr *Mycobacterium bovis*. Pessi stofn er ekki meinvirkur. Því þarf ekki að einangra sjúklinginn.

Altækur BCG sýkingar geta jafnvel komið fram nokkrum árum eftir að síðasti skammturinn var gefinn með ídreypingu í þvagblöðru. Pessum sýkingum geta fylgt hiti, næturnsviti, þyngdartap, bólguhnúðar í lungum eða lifur, tárubólga eða Reiters heilkenni, kýli, slagæðargúlpar ásamt sýkingu eða sýking í ígræði eða ágræðslu sem er til staðar á nærliggjandi vef. Afar mikilvægt er að greina meiníð snemma og meðhöndla það á viðeigandi hátt svo unnt sé að draga úr hugsanlegum afleiðingum sýkingarinnar.

Athugið að þótt próf reynist neikvætt hvað varðar Mycobacteriaceae-tegundir útilokar það ekki altækra BCG sýkingu, burtséð frá þeiri gerð sýnis sem notað er (blóð, þvag, sæði). Tilkynnt hefur verið um nokkuð mörg tilfelli þar sem ræktun blóð-/þvagsýna reyndist neikvæð þrátt fyrir að sjúklingur væri með altækra BCG sýkingu.

Ef grunur leikur á um BCG sýkingu fer meðferðin eftir eðli og vægi klínískra einkenna.

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur eru um að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, samkvæmt leiðbeiningum á vefsíðum stofnunarinnar, www.lyfjastofnun.is. Snúið spjaldinu við til að fá upplýsingar um tengiliði.

Sjá frekari upplýsingar í nágildandi samantekt á eiginleikum lyfs.

Ráðlagt er að ráðfæra sig við smitsjúkdómalækni.

MIKILVÆGT:

Á þessu spjaldi er að finna mikilvægar öryggisupplýsingar sem þér þarf að vera kunnugt um meðan á meðferð stendur með BCG-medac og eftir að henni lýkur. Hafðu spjaldið ávallt með þér (t.d. í veskinu) og sýndu það öllum heilbrigðisstarfsmönnum sem koma að meðferð þinni, en ekki aðeins þvagfæraserfræðingnum sem ávisar lyfinu. Hafðu spjaldið einnig við höndina eftir að meðferðinni með BCG-medac er lokið!

Vart getur orðið við aukaverkanir af BCG-medac hvenær sem er meðan á meðferð stendur og jafnvel nokkrum árum eftir að meðferð lýkur. Ef slíkar aukaverkanir greinast er hægt að meðhöndl að þær.

Láttu lækninn einnig vita ef þú finnur fyrir öðrum grunsamlegum einkennum sem ekki eru tilgreind á spjaldinu en valda þér áhyggjum.

Ekki reyna að meðhöndl einkennin sjálf/ur með öðrum lyfjum.

Meðferð með BCG-medac getur valdið aukaverkun í formi altækra sykingar. Slík sýking getur komið fram hvenær sem er, jafnvel nokkrum árum eftir síðustu ídreypingu. Pegar hún greinist er hins vegar hægt að meðhöndl hana.

Stundum er erfitt að þekkja merki og einkenni svokallaðrar „síðkominnar BCG sýkingar“ þar sem þau geta líkst öðrum sjúkdóum.

Merki og einkenni sýkingar af völdum BCG utan þvagblöðru geta m.a. verið

- Hærri hiti en 39.5°C sem varir a.m.k. 12 klst. eða hærri hiti en 38°C sem varir nokkrar vikur; nætursviti
- Þyngdartap af ópekktors orsök
- Versnandi líðan
- Merki um bólgu geta verið mismunandi og birst í eftirfarandi formi:
 - öndunarferfiðleikar eða hósti sem eru öðruvísi en venjulegt kvef,
 - lifrarkvillar: þróustingstilfinning hægra megin í efri hluta kviðar eða óeðilegar niðurstöður lifrarprófa (einkum hvað varðar ensím sem kallast alkalískur fosfatasi), eða
 - verkir og roði í auga, sjónkvillar eða þokusýn; augnroði
- Svkölluð hnúðabólga sem komið hefur í ljós í vefjasýni.

Farðu á sjúkrahús, til heimilislæknis eða þvagfæralæknins, ef vart verður við tvær eða fleiri af þeim aukaverkunum sem greint er frá hér fyrir ofan, jafnvel þótt langur tími hafi liðið síðan krabbameinið í þvagblöðrunni var meðhöndlæ.

- Hafðu öryggisspjaldið og lista yfir öll lyf sem þú notar með þér, þ.m.t. lyf sem fengin eru með eða án lyfseðils, vitamín og jurtalyf.

Láttu lækna og/eða hjúkrunarfræðinga vita að þú fáir/hafir fengið meðferð með BCG og sýndu þeim spjaldið svo þeir viti hvernig rétt sé að meðhöndl þig.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Mjög mikilvægt er að láta lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.