

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irinotecan medac 20 mg/ml, Infusiomittausaine, liuosta varten

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra infusiomittausaine, liuosta varten, sisältää 20 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia, mikä vastaa 17,33 mg irinotekaania.

Jokainen 2 ml:n injektiopullo sisältää 40 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia (40 mg/2 ml).
Jokainen 5 ml:n injektiopullo sisältää 100 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia (100 mg/5 ml).
Jokainen 15 ml:n injektiopullo sisältää 300 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia (300 mg/15 ml).
Jokainen 25 ml:n injektiopullo sisältää 500 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia (500 mg/25 ml).
Jokainen 50 ml:n injektiopullo sisältää 1000 mg irinotekaanihydrokloriditrihydroaattia (1000 mg/50 ml).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Sorbitoli (E420)

Tämä lääkevalmiste sisältää 45 mg sorbitolia per ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Infusiomittausaine, liuosta varten.

Kirkas keltainen liuos.

pH 3,0 – 3,8

4. KLIINiset tiedot

4.1 Käyttöaiheet

Irinotecan medac on tarkoitettu pitkälle edenneen kolorektaalisyövän hoitoon:

- 5-fluorourasiili ja foliinhappoon yhdistettynä potilaille, jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa pitkälle edenneeseen tautiin.
- ainoana lääkkeenä potilaille, joilla 5-fluorourasiilia sisältävä lääkehoito ei ole tuottanut tulosta.

Irinotecan medacin ja setuksimabin yhdistelmää käytetään epidermaalisen kasvutekijän reseptoria (EGFR) ja vilityypin KRAS-geeniä ilmentävän metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon silloin, kun potilas ei ole saanut aiempaa hoitoa metastasoituneeseen tautiin tai irinotekaania sisältävä solunsalpaajahoito on epäonnistunut (ks. kohta 5.1).

Irinotecan medacia käytetään yhdessä 5-fluorourasiilin, foliinhapon ja bevasitumabinn kanssa ensilinjan hoitona metastasoituneessa koolon- tai peräsuolikarsinoomassa.

Irinotecan medacin ja kapesitabiinin yhdistelmä (jonka kanssa saatetaan antaa myös bevasitumabia) on tarkoitettu metastasoituneen kolorektaalikarsinooman ensilinjan hoidoksi.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Vain aikuisille. Laimentamisen jälkeen irinotekaani-infusio liuos tulee infusoida ääreis- tai keskuslaskimoon.

Suositusannos:

Yksilääkehoidossa (aikaisemmin hoitoa saaneille potilaille)

Suositeltu irinotekaaniannos on 350 mg/m² laskimoon 30–90 minuutin kestoisena infuusiona kolmen viikon välein (ks. kohdat 4.4 ja 6.6).

Monilääkehoidossa (aikaisemmin hoitamattomille potilaille)

Irinotekaanin turvallisuutta ja tehoa 5-fluorourasiiliin (5-FU) ja foliinihappoon (FA) yhdistettynä on arvioitu seuraavalla hoito-ohjelmalla (ks. kohta 5.1).

- Irinotekaani ja 5-FU/FA kahden viikon välein
Suositeltu irinotekaaniannos on 180 mg/m² laskimoon kahden viikon välein yhtenä 30–90 minuutin kestoisena infuusiona, minkä jälkeen infusoidaan foliinihappo ja 5-fluorourasiili.

Samanaikaisesti annettavan setuksimabin annostuksessa ja antotavassa on noudatettava kyseisen lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon ohjeita.

Normaalista käytetään samaa irinotekaaniannosta kuin aiemman irinotekaania sisältäneen hoito-ohjelman viimeisten hoitosyklien aikana. Irinotekaania saa antaa aikaisintaan yhden tunnin kuluttua setuksimabi-infusioon päätymisestä.

Katso bevasitsumabin annostus ja antotapa sen valmisteyhteenvedosta.

Katso kapesitabiiniyhdistelmän annostus ja antotapa kohdasta 5.1 sekä lisätietoa kapesitabiinin valmisteyhteenvedon asianmukaisista kohdistista.

Annoksen muuttaminen:

Irinotekaania voi antaa vasta sen jälkeen, kun kaikki haittavaikutukset ovat asianmukaisesti korjaantuneet NCI-CTC (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) -asteikolla tasolle 0 tai 1 ja kun hoitoon liittyvä ripuli on täysin parantunut.

Seuraavan infuusiohoidon alussa irinotekaanin, ja tarvittaessa 5-FU:n, annosta on pienennettävä aiemman infuusion yhteydessä havaittujen vaikeimpien haittavaikutusten mukaan. Hoitoa on tarvittaessa myöhennettävä 1–2 viikkolla, jotta hoitoon liittyneet haittavaikutukset ehtivät korjaantua.

Jos potilaalla ilmenee seuraavia haittavaikutuksia, on irinotekaanin ja/tai 5-FU:n annosta tarvittaessa pienennettävä 15–20 %:

- hematotoksisuus (asteen 4 neutropenia, kuumeinen neutropenia [asteen 3–4 neutropenia ja asteen 2–4 kuume], trombosytopenia ja [asteen 4] leukopenia)
- muu kuin hematologinen toksisuus (aste 3–4).

Setuksimabin ja irinotekaanin monilääkehoidossa on noudatettava kyseisen lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon mukaisia suosituksia annostuksen muuttamisesta.

Annettaessa valmistetta yhdessä kapesitabiinin kanssa vähintään 65-vuotialle potilaille kapesitabiinin aloitusannosta on suositeltavaa pienentää annokseen 800 mg/m² kahdesti vuorokaudessa kapesitabiinin

valmistehteenvedon mukaisesti. Katso kapesitabiinin valmistehteenvedosta myös monilääkehoidon annosmuutoksia koskevat suositukset.

Hoidon kesto:

Irinotekaanihoitoa tulee jatkaa, kunnes tauti objektiivisesti arvioituna etenee tai potilaalla ilmenevä toksisuus ei ole enää hyväksyttävää.

Erityispotilasryhmät:

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Yksilääkehoido: Jos potilaan WHO-toimintakykyluokka on ≤ 2 , irinotekaanin aloitusannos määritetään veren bilirubiiniarvojen (enintään kolme kertaa normaalilta yläraja [ULN]) perusteella. Jos näillä potilailla on hyperbilirubinemia ja protrombiiniaika on yli 50 % pidempi, on irinotekaanin puhdistuma heikentynyt (ks. kohta 5.2) ja hematotoksisuuden riski on siksi suurentunut. Siksi tämän potilasryhmän täydellistä verenkuvaan on seurattava viikoittain.

- Jos potilaan bilirubiiniarvo on 1,5 kertaa normaalilta yläraja, on irinotekaanin suositeltu annos 350 mg/m^2
- Jos potilaan bilirubiiniarvo on 1,5–3 kertaa normaalilta yläraja, on irinotekaanin suositeltu annos 200 mg/m^2
- Jos potilaan bilirubiiniarvo on yli 3 kertaa normaalilta yläraja, ei potilasta saa hoitaa irinotekaanilla (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Irinotekaania sisältävän monilääkehoidon antamisesta maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei ole tietoa.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Irinotekaanin antamista ei suositella munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, koska valmisteen käyttöä ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Läikkäät potilaat

Iäkkäillä potilailla ei ole tehty spesifejä farmakokineettisiä tutkimuksia. Tälle potilasryhmälle annettava annos on kuitenkin määritettävä huolellisesti, koska näillä potilailla elintoiminnot useammin ovat heikentyneet. Tämä potilasryhmä tarvitsee muita tehostetumpaa tarkkailua (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Irinotekaanin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Ennen lääkkeen käsitelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoaa.

4.3 Vasta-aiheet

- Krooninen tulehduslinnen suolistosairaus ja/tai suolitukos (ks. kohta 4.4).
- Yliherkkyyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Imetys (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).
- Bilirubiiniarvot yli kolminkertaiset normaalilta ylärajaan nähden (ks. kohta 4.4).

- Vakava luuytimen vajaatoiminta.
- WHO-toimintakykyluokka > 2.
- Mäkikuisman samanaikainen käyttö (ks. kohta 4.5)
- Elävät heikennetyt rokotteet (ks. kohta 4.5)

Tarkista setuksimabin ja bevasitsumabin tai kapesitabiinin muut vasta-aiheet kyseisen valmisten valmisteyhteenvedosta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Irinotekaania saa antaa vain solunsalpaajahoitoon erikoistuneessa hoitojaksikössä ja vain syövän kemoterapiaan perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Irinotekaanin haittavaikutusten luonteen ja ilmaantuvuuden vuoksi valmistetta tulee määräätä seuraavissa tapauksissa vasta, kun hoidon odotettavissa olevat hyödyt ja mahdolliset riskit on punnittu:

- riskiryhmään kuuluvat potilaat, etenkin, jos potilaan WHO-toimintakykyluokka = 2.
- ne harvinaiset tapaukset, jolloin potilas todennäköisesti ei noudata haittavaikutusten hoitoon liittyviä suosituksia (viivästyneen ripulin ilmetessä on aloitettava välittömästi pitkäkestoinen ripulilääkitys ja juotava runsaasti nestettä). Näille potilaille suositellaan tiivistä seurantaa sairaalassa.

Kun irinotekaania käytetään yksiläkehoitonä, se usein määräätään annettavaksi kolmen viikon välein. Viikoittaista annosohjelmaa (ks. kohta 5) voidaan kuitenkin harkita potilaille, jotka saattavat tarvita tiiviimpää seurantaa tai joilla vakavan neutropenian riski on erityisen suuri.

Viivästynyt ripuli

Potilaalle on kerrottava riskistä sairastua viivästyneeseen ripuliin, joka ilmaantuu myöhemmin kuin 24 tunnin kuluttua irinotekaanin antamisesta milloin tahansa ennen seuraavaa hoitokertaa. Yksiläkehoidossa mediaaniaika irinotekaani-infusiossa ensimmäisen ripuliuulosten ilmaantumiseen oli viisi vuorokautta. Potilaan on viipymättä ilmoitettava lääkärille ripulin ilmaantumisesta ja aloitettava asianmukainen hoito heti.

Potilaalla ripulin ilmaantumisen riski on suurentunut, jos hän on saanut aiemmin sädehoitoa vatsan tai lantion alueelle, jos hänen on ennen hoidon aloittamista hyperleukosytoosi, jos potilaan WHO-toimintakykyluokka on ≥ 2 tai jos potilas on nainen. Jos ripulia ei hoideta asianmukaisesti, se voi olla hengenvaarallinen, etenkin jos potilaalla on samanaikaisesti neutropenia.

Potilaan on heti ensimmäisen ripuliuulosten ilmaannuttua ryhdyttää juomaan elektrolyttejä sisältäviä juomia runsaasti ja aloitettava heti asianmukainen ripulin lääkitys. Ripulilääkityksen määräätä irinotekaania antanut hoitojakkö. Potilaan on heti sairaalasta kotiuttamisen jälkeen hankittava hänen määrätyt ripulilääkevalmisteet, jotta hän voi aloittaa hoidon heti kun ripuli alkaa. Potilaan on myös ilmoitettava lääkärille tai irinotekaania antaneelle hoitojaksolle ripulin ilmaantumisesta.

Ripulin hoitoon suositellaan nykyään loperamidia suurina annoksina (aloitusannos 4 mg, ja sen jälkeen 2 mg kahden tunnin välein). Tätä hoitoa on jatkettava vielä 12 tunnin ajan viimeisestä ripuliuulosteesta eikä hoitoa saa muuttaa. Paralyyttisen ileuksen riskin vuoksi loperamidia ei saa missään tapausessa käyttää tällä annostuksella yhtäjaksoisesti pidempään kuin 48 tuntia. Hoidon on kuitenkin kestettävä vähintään 12 tuntia.

Ripulilääkityksen lisäksi potilaalle on annettava lajakirjoista antibioottia estohoitona silloin kun ripuliin liittyy vakava neutropenia (neutrofiliarvo < 500 solua/mm³).

Seuraavissa tapauksissa suositellaan ripulin ilmaantuessa antibioottihoidon lisäksi sairaalahoitoa:

- ripuliin liittyy kuumetta
- ripuli on vakava (vaatii laskimoon annettavaa nesteytystä)
- ripuli on jatkunut yli 48 tuntia suuriannoksen loperamidioidon jälkeen.

Loperamidia ei saa antaa estohoitona edes potilaille, joilla on esiintynyt viivästynytä ripulia aiemmillä hoitokerroilla.

Jos potilaalla on ollut vakavaa ripulia, suositellaan annoksen pienentämistä seuraavilla hoitokerroilla (ks. kohta 4.2).

Hematologia

NCI-CTC-asteikon tason 3 ja 4 neutropenian esiintyvyys on kliinisissä tutkimuksissa ollut merkitsevästi suurempi aiemmin sädehoittoa lantion/vatsan alueelle saaneilla potilailla kuin sitä saamattomilla potilailla. Potilailla, joiden seerumin kokonaabisilirubiinitaso oli lähtötilanteessa vähintään 1,0 mg/dl, oli myös merkitsevästi suurempi todennäköisyys kärsiä ensimmäisen hoitokerran aikana tason 3 tai 4 neutropeniasta kuin potilailla, joiden bilirubiinitaso oli alle 1,0 mg/dl.

Irinotekaanihoidon aikana suositellaan täydellisen verenkuvan seuraamista viikoittain. Potilaalle on kerrottava neutropenian riskistä ja kuumeen merkityksestä. Kuumeinen neutropenia (kuume $> 38^{\circ}\text{C}$ ja neutrofiilimäärä $\leq 1\,000$ solua/mm 3) on hoidettava heti sairaalassa laajakirjoisilla laskimoon annettavilla antibiooteilla.

Annoksen pienentämistä seuraavan antokerran yhteydessä suositellaan potilailla, joilla on esiintynyt vaikeita hematologisia episodeja (ks. kohta 4.2).

Jos potilaalla on vakava ripuli, infektioiden ja hematotoksisuuden riski suurenee. Vakavaa ripulia sairastavalta potilaalta on tutkittava täydellinen verenkuva.

UGT1A1-entsyymin vähentynyt aktiivisuus

Hitailla UGT1A1-metaboloidilla, kuten Gilbertin oireyhtymää (esim. homotsygoottinen variantti UGT1A1*28 tai UGT1A1*6 suhteen) sairastavilla potilailla, on suurentunut vakavan neutropenian ja ripulin riski irinotekaanihoidon jälkeen. Tämä riski kasvaa irinotekaaniannosmäärän mukaan.

Vaikka tarkkaa aloitusannostuksen pienentämisen tarvetta ei tiedetä, irinotekaanin aloitusannoksen pienentämistä tulee harkita hitailla UGT1A1-metaboloidilla, erityisesti potilailla, joille annettavat annokset ovat > 180 mg/m 2 tai joilla on heikentynyt terveydentila. Tässä potilasryhmässä on huomioitava soveltuviin hoitosuositusten annossuositukset. Seuraavia annoksia voidaan suurentaa sen mukaan, kuinka potilas sietää hoidon.

UGT1A1-genotyypitystä voidaan käyttää niiden potilaiden tunnistamiseen, joilla on suurentunut vakavan neutropenian ja ripulin riski. Ennen hoitoa tehtävän genotyypityksen klinisestä hyödystä ei kuitenkaan ole varmuutta, koska UGT1A1-geenin polymorfia ei selitä kaikkea irinotekaanihoidosta aiheutuvaa toksisuutta (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Maksan toimintakokeet on tehtävä aloitustilanteessa sekä ennen kutakin hoitokertaa.

Täydellistä verenkuvaa on seurattava viikoittain potilailla, joilla bilirubiiniarvo on 1,5–3 kertaa normaalilta yläraja, koska irinotekaanin puhdistuma on tällöin pienentynyt (ks. kohta 5.2) ja tässä potilasryhmässä hematotoksisuuden vaara on siten suurenut. Jos potilaan bilirubiiniarvot ovat yli kolme kertaa normaalilta yläraja, ks. kohta 4.3.

Pahoinvoindi ja oksentelu

Antiemeeteillä annettavaa estohoitoa suositellaan ennen kutakin irinotekaani-hoitokertaa. Pahoinvointia ja oksentelua on ilmoitettu usein. Jos potilas oksentelee viivästyneen ripulin yhteydessä, hänet on otettava sairaalahoitoon mahdollisimman pian.

Akuutti kolinerginen oireyhtymä

Jos potilaalle kehittyy akuutti kolinerginen oireyhtymä (varhaisessa vaiheessa ilmaantuva ripuli ja erilaiset muut merkit ja oireet, kuten hikoilu, vatsan kouristelu, mioosi ja lisääntynyt syljeneritys), on potilaalle annettava atropiinisulfaattia (0,25 mg ihon alle), ellei se ole klinisesti vasta-aiheista (ks. kohta 4.8). Näitä oireita voi ilmetä irinotekaani-infusioon annon aikana tai pian sen jälkeen, ja niiden ajatellaan liittyvän irinotekaanin kanta-aineen antikoliesterasiaktiivisuuteen. Niitä odotetaan esiintyvän useammin suurempien irinotekaaniannosten yhteydessä.

Hoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on astma. Jos potilaalle kehittyyakuutti ja vakava kolinerginen oireyhtymä, suositellaan, että hänelle seuraavien irinotekaani-annosten yhteydessä annetaan estohoitona atropiinisulfaattia.

Hengityshäiriöt

Interstitiaalinen keuhkosairaus, joka ilmenee keuhkoinfiltratteinä, on melko harvinainen irinotekaanihoidon aikana. Interstitiaalinen keuhkosairaus voi olla kuolemaan johtava. Riskitekijöitä, jotka mahdollisesti liittyvät interstitiaalisen keuhkosairauden kehittymiseen, ovat keuhkotoksisten lääkevalmisteiden käyttö, sädehoito ja kasvupesäkkeitä stimuloivat tekijät (CSF). Riskiryhmään kuuluvien potilaiden tilaa on seurattava tarkoin hengitysoireiden varalta sekä ennen irinotekaanihointoa että sen aikana.

Ekstravasaatio

Vaikka irinotekaani ei olekaan tunnettu nesterakkuloiden aiheuttaja, varovaisuutta on noudatettava ekstravasaation välittämiseksi ja infuusiokohdan seuraamiseksi tulehdusen merkkien varalta. Ekstravasaation sattuessa suositellaan ihoalueen huuhtelua ja hoitamista jääällä.

Iäkkäät potilaat

Koska iäkkäään potilaan elintoiminnot, erityisesti maksan toiminta, ovat useammin heikentyneet, on noudatettava varovaisuutta kun valitaan annos tähän potilasryhmään kuuluville (ks. kohta 4.2).

Potilaat, joilla on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus ja/tai suolitukos

Potilaalle ei saa antaa irinotekaanihointoa ennen kuin hän on toipunut suolitukoksesta (ks. kohta 4.3).

Munuaisten toiminta

Seerumin kreatiniini- tai veren ureatypipitoisuksien on havaittu kasvaneen. Joissakin tapauksissa on ilmennyt munuaisten akuutia vajaatoimintaa. Näiden tapahtumien on yleensä ajateltu johtuvan infektiokomplikaatioista tai pahoinvoindiin, oksenteluun tai ripuliin liittyvästä kuivumisesta. Harvinaisissa tapauksissa on raportoitu myös tuumorilyysioireyhtymästä johtuvaa munuaisten toimintahäiriötä.

Sädehoito

Aiemmin sädehoitoa lantion/vatsan alueelle saaneilla potilailla on suurempi luuydinlaman riski irinotekaanin annon jälkeen. Lääkärien on noudatettava varovaisuutta hoitaessaan potilaita, jotka ovat aiemmin saaneet laaja-alaista sädehoitoa (esim. > 25 % luuytimestä sädetetty kuuden viikon sisällä ennen irinotekaanihoidon aloittamista). Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen tälle potilasryhmälle (ks. kohta 4.2).

Sydänhäiriöt

Sydänlihaksen iskeemisiä tapahtumia on havaittu irinotekaanihoidon jälkeen pääasiassa potilailla, joilla on taustalla jokin sydänsairaus, sydänsairauden muita tunnettuja riskitekijöitä tai jotka ovat saaneet aiemmin sytotoksista kemoterapiaa (ks. kohta 4.8).

Siksi tunnettuja riskitekijöitä omaavia potilaita on seurattava tarkoin ja on pyrittävä minimoimaan kaikki riskitekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa (esim. tupakointi, hypertensio ja hyperlipidemia).

Verisuonihäiriöt

Irinotekaani on harvinaisissa tapauksissa yhdistetty tromboemboliin tapahtumiin (keuhkoembolia, laskimotromboosi ja valtimon tromboembolia) potilailla, joilla on monia riskitekijöitä taustalla olevan kasvaimen lisäksi.

Muut

Irinotekaanin samanaikainen käyttö P450 3A4 -sytokromia (CYP3A4) voimakkaasti estävien (esim. ketokonatsoli) tai indusoivien (esim. rifampisiini, karbamasepiini, fenobarbitali, fenytoini, apalutamidi) lääkeaineiden kanssa voi muuttaa irinotekaanin metabolismaa, joten samanaikaista annostelua on vältettävä (ks. kohta 4.5).

Harvinaisissa tapauksissa on todettu munuaisten vajaatoimintaa, hypotensiota tai verenkiertokollapsi potilailla, joilla on ollut ripuliin ja/tai oksenteluun liittyvä elimistön kuivumistila tai sepsis.

Ehkäisy naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi / miehillä

Genotksisuuden mahdollisuuden takia naispotilaita, jotka voivat tulla raskaaksi, on ohjeistettava käyttämään erittäin tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan viimeisen irinotekaaniannoksen jälkeen.

Genotksisuuden mahdollisuuden takia miespotilaita, joiden naispuolin kumppani voi tulla raskaaksi, on ohjeistettava käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan viimeisen irinotekaaniannoksen jälkeen (ks. kohta 4.6).

Imetys

Koska hoito saattaa aiheuttaa imetettävälle lapselle haittavaikutuksia, rintaruokinta on lopetettava irinotekaanihoidon ajaksi (ks. kohdat 4.3 ja 4.6).

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää sorbitolia (ks. kohta 2). Sorbitoli on fruktoosin lähde. Potilaille, joilla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), ei saa antaa tästä lääkevalmisteita, ellei se ole ehdottoman välittämätöntä.

Vauvoilla ja pienillä lapsilla (alle 2-vuotiaat) ei vielä välittämättä ole diagnosoitu perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia (HFI). Laskimoon annettavat lääkevalmisteet (sorbitolia/fruktoosia sisältävät) saattavat olla hengenvaarallisia ja niiden käyttö on vasta-aiheista tässä väestöryhmässä, paitsi tilanteissa joissa lääkevalmisteen käytölle on ehdoton kliininen tarve eikä muita vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Kunkin potilaan yksityiskohtaiset HFI-oireisiin liittyvät esitiedot on selvitetävä ennen tämän lääkevalmisteen antoa.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Samanaikainen käyttö vasta-aiheista (ks. kohta 4.3)

Mäkikuisma: Pienentää irinotekaanin aktiivisen metaboliitin, SN-38:n, pitoisuutta plasmassa. Pienessä farmakokineettisessä tutkimuksessa ($n = 5$), jossa potilaat saivat samanaikaisesti 350 mg/m² irinotekaania ja 900 mg mäkikuismaa (*Hypericum perforatum*), irinotekaanin aktiivisen metaboliitin SN-38:n pitoisuus plasmassa pieneni 42 %. Mäkikuisma pienentää SN-38:n pitoisuutta plasmassa. Näin ollen mäkikuismaa ei saa antaa samanaikaisesti irinotekaanin kanssa.

Elävät heikennetyt rokotteet (esim. keltakuumerokekote): Mahdollisesti kuolemaan johtavan yleistyneen reaktion riski rokotteista johtuen. Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista irinotekaanihoidon aikana ja 6 kuukauden ajan solunsalpaajahoidon päättymisen jälkeen. Tapettuja tai inaktivoituja rokotteita voidaan antaa, mutta vaste tällaisiin rokotteisiin voi olla tavanomaista heikompi.

Samanaikaista käyttöä ei suositella (ks. kohta 4.4)

Irinotekaanin ja sytokromi P4503A4:n (CYP3A4) indusoijan samanaikainen käyttö voi muuttaa irinotekaanin metabolismaa, joten sitä pitää välttää (ks. kohta 4.4):

Voimakkaat CYP3A4:ää ja/taiUGT1A1:tä indusoivat lääkevalmisteet: (esim. rifampisiini, karbamatepiini, fenobarbitaali, fenytoiini tai apalutamidi)

Pienentyneen irinotekaani-, SN-38- ja SN-38:n glukuronidialtiukseen sekä heikentyneiden farmakodynaamisten vaikutusten riski. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että CYP3A:ta indusoivien antikonvulsioivisten lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö pienentää altistusta irinotekaanille, SN-38:lle ja SN-38:n glukuronidille ja heikentää farmakodynaamisia vaikutuksia. Tällaisten antikonvulsioivisten lääkevalmisteiden vaikutukset näkyvät SN-38:n ja SN-38G:n AUC-arvojen pienemisenä vähintään puoleen. Sytokromi P450 3A4 -entsyyminen induktion lisäksi glukuronidaation ja sapenerityksen lisääntyminen saattaa vähentää altistusta irinotekaanille ja sen metaboliteille. Lisäksi fenytoniini: Kouristusten riski voi suurentua, sillä sytoksiset lääkeaineet voivat heikentää fenytoiinin imeytymistä ruoansulatuskanavasta.

Voimakkaat CYP3A4:n estäjät: (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, proteasinestäjät, klaritromysiini, erytromysiini, telitromysiini)

Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että samanaikainen ketokonatsolin antaminen pienensi aminopentanoapon (APC) AUC-arvoa 87 % ja suurensi SN-38:n AUC-arvoa 109 % verrattuna irinotekaani-yksilääkehoitoon.

UGT1A1:n estäjät: (esim. atatsanaviiri, ketokonatsoli, regorafenibi)

Voi suurentaa systeemistä altistusta irinotekaanin aktiiviselle metaboliitille, SN-38:lle. Lääkärin on otettava tämä huomioon, mikäli lääkeyhdistelmän käyttö on välttämätöntä.

Muut CYP3A4:n estäjät: (esim. kritsotinibi, idelalisibi)

Irinotekaanin toksisuuden lisääntymisen riski, mikä on seurausta kritsotinibin tai idelalisibin aiheuttamasta irinotekaanin metabolismin vähenemisestä.

Käytössä noudatettava varovalisuutta

K-vitamiinin antagonistit: Lisääntynyt syöpään liittyvien verenvuotojen ja tromboottisten tapahtumien riski. Jos K-vitamiinin antagonistien käyttö on tarpeen, INR (International Normalised Ratio) -arvoa on seurattava tiheämmin.

Samanaikaista käyttöä harkittava

Immuunijärjestelmää lamaavat lääkeaineet: (esim. siklosporiini, takrolimuusi): Liiallinen immunosuppressio, johon liittyy lymfoproliferaation riski.

Hermo-lihasliitosta salpaavat lääkeaineet: Irinotekaanin ja hermo-lihasliitosta salpaavien lääkeaineiden välisiä yhteisvaikutuksia ei voida sulkea pois. Koska irinotekaanilla on antikoliiniesteraasiaktiivisuutta, se saattaa pidentää suksametonin hermo-lihasliitosta salpaavia vaikutuksia ja kumota ei-depolarisoivien vaikuttavien aineiden hermo-lihasliitossalpauksen.

Muut yhdistelmät

5-fluorourasiili/foliinihappo: 5-fluorourasiilin ja foliinihapon samanaikainen anto monilääkehoidossa ei muuta irinotekaanin farmakokinetikkaa.

Bevasitsumabi: Lääkeaineinteraktioita selvittävässä tutkimuksessa bevasitsumabilla ei havaittu merkittävää vaikutusta irinotekaanin tai sen aktiivisen metaboliitin, SN38:n, farmakokinetiikkaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta toksisuuden lisääntymiseen näiden lääkeaineiden farmakologisiin ominaisuuksiin perustuen.

Setuksimabi: Setuksimabin vaikutuksesta irinotekaanin turvallisuusprofiiliin tai päinvastoin ei ole näyttöä.

Syöpälääkkeet (mukaan lukien flusytosiini 5-fluorourasiilin aihiolääkkeenä): Muut syöpälääkkeet, joiden haittavaikutusprofiili on samankaltainen, voivat pahentaa irinotekaanin haittavaikutuksia, kuten luuydinlamaa.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ehkäisy

Genotoksisuuden mahdollisuuden takia naispotilaita, jotka voivat tulla raskaaksi, on ohjeistettava käyttämään erittäin tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan viimeisen irinotekaaniannoksen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Genotoksisuuden mahdollisuuden takia miespotilaita, joiden naispotilainen kumppani voi tulla raskaaksi, on ohjeistettava käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan viimeisen irinotekaaniannoksen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Raskaus

On vain vähän tietoja irinotekaanin käytöstä raskaana oleville naisille. Irinotekaanin on osoitettu olevan alkiotoksinen ja teratogeeninen eläimillä (ks. kohta 5.3). Eläintutkimusten tuloksiin ja irinotekaanin vaikutusmekanismiin perustuen irinotekaania ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selkeästi tarpeen. Irinotekaanihoitoa ei pidä aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ellei raskauden mahdollisuutta ole suljettu pois. Raskaaksi tulemista on välttää, jos kumpi tahansa kumppani saa irinotekaanihoitoa.

Imetys

Saatavilla olevat vähäiset tiedot viittaavat siihen, että irinotekaani ja sen metaboliitti erityvästi ihmisen rintamaitoon. Koska hoito saattaa aiheuttaa imetettävälle lapselle haittavaikutuksia, rintaruokinta on lopetettava irinotekaanihoidon ajaksi (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Hedelmällisyys

Irinotekaanin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyteen ei ole olemassa tietoa. Eläimillä on havaittu irinotekaanin haitallisia vaikutuksia jälkeläisten hedelmällisyteen (ks. kohta 5.3). **Potilaille voi olla hyvä kertoa sukusuolujen talletuksesta ennen Irinotecan medac -hoidon aloittamista.**

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Irinotekaanilla on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaita on varoitettava siitä, että huimausta tai näköhäiriötä voi mahdollisesti esiintyä 24 tunnin ajan irinotekaanihoidon antamisen jälkeen, ja heitä on kehotettava olemaan ajamatta autoa ja käyttämättä koneita, jos näitä oireita ilmaantuu.

4.8 Haittavaikutukset

KLIINISET TUTKIMUKSET

Haittavaikutustietoja on kerätty laajasti metastasoidunutta kolorektaalisyöpää koskevista tutkimuksista, ja esiintyyvyydet esitetään jäljempänä. Haittavaikutukset muiden käyttöaiheiden yhteydessä ovat oletettavasti samankaltaisia kuin kolorektaalisyövän yhteydessä.

Irinotekaanin yleisimmät ($\geq 1/10$) annosta rajoittavat haittavaikutukset ovat viivästynyt ripuli (esiintyy yli 24 tunnin kuluttua annostelusta) ja verihäiriöt, mukaan lukien neutropenia, anemia ja trombosytopenia.

Neutropenia on annosta rajoittava toksinen vaikutus. Neutropenia oli palautuvaa eikä se kumuloitunut. Mediaaniaika pienimpään arvoon (nadir) oli 8 vuorokautta riippumatta siitä, miten valmistetta käytettiin yksiläke- tai monilääkehoidossa.

Vaikea-asteista ohimenevää akuuttia kolinergistä oireyhtymää havaittiin hyvin yleisesti.

Pääasiallisiksi oireiksi määriteltiin varhainen ripuli ja muut erilaiset oireet, kuten vatsakipu, hikoilu, mioosi ja lisääntynyt syljeneritys, joita esiintyi hoidon aikana tai ensimmäisten 24 tunnin kuluessa irinotekaaniinfusion antamisesta. Nämä oireet häviävät atropiinin antamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

YKSILÄÄKEHOITO

Seuraavassa mainitut haittavaikutukset liittyvät mahdollisesti tai todennäköisesti irinotekaanin annosteluun ja niitä on ilmoitettu yksilääkehoitoa suositeltuna 350 mg/m² annoksena saaneilla 765 potilaalla.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyyssluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Esiintyyvyydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen ($\geq 1/10$), yleinen ($\geq 1/100$, $< 1/10$), melko harvinainen ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$), harvinainen ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$) ja hyvin harvinainen ($< 1/10\ 000$).

Irinotekaanimonoterapien (350 mg/m ² kerran 3 viikossa) yhteydessä raportoidut haittavaikutukset		
MedDRA-elinjärjestelmä	Esiintyyvyys	Suositeltu termi
Infektiot	Yleinen	Infektio
Veri ja imukudos	Hyvin yleinen	Neutropenia
	Hyvin yleinen	Anemia
	Yleinen	Trombosytopenia
	Yleinen	Kuumeinen neutropenia
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	Hyvin yleinen	Heikentynyt ruokahalu
Hermosto	Hyvin yleinen	Kolinerginen oireyhtymä
Ruoansulatuselimistö	Hyvin yleinen	Ripuli
	Hyvin yleinen	Oksentelu
	Hyvin yleinen	Pahoinvoitti
	Hyvin yleinen	Vatsakipu
	Yleinen	Ummetus
Iho ja ihonalainen kudos	Hyvin yleinen	Alopecia (korjautuva)
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	Hyvin yleinen	Limakalvotulehdus
	Hyvin yleinen	Kuume
	Hyvin yleinen	Astenia
Tutkimukset	Yleinen	Suurentunut veren kreatiniinipitoisuus
	Yleinen	Suurentunut transaminaasipitoisuus (ALAT ja ASAT)
	Yleinen	Suurentunut veren bilirubiinipitoisuus
	Yleinen	Suurentunut veren alkalisen fosfataasin pitoisuus

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus (yksilääkehoito)

Vaikea-asteista ripulia havaittiin 20 %:lla potilaista, jotka noudattivat ripulin hoitoa koskevia suosituksia. Vaikea-asteista ripulia esiintyi 14 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä. Ajan mediaani ripulin ilmaantumiseen oli 5 päivää irinotekaani-infusion antamisesta.

Pahoinvoindi ja oksentelu olivat vaikea-asteisia noin 10 %:lla potilaista, jotka saivat pahoinvointia estääväät hoitoa.

Ummetusta on havaittu alle 10 %:lla potilaista.

Neutropeniaa havaittiin 78,7 %:lla potilaista ja se oli vaikea-asteista (neutrofiilimääärä < 500 solua/mm³) 22,6 %:lla potilaista. Neutrofiilimääärä oli alle 1 000 solua/mm³ 18 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä, ja neutrofiilimääärä oli < 500 solua/mm³ 7,6 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä.

Neutrofiilimääärä oli korjautunut täysin tavallisesti päivään 22 mennessä.

Kuumeista neutropeniaa raportoitiin 6,2 %:lla potilaista ja 1,7 %:ssa hoitosykleistä.

Infektioita esiintyi noin 10,3 %:lla potilaista (2,5 %:ssa hoitosykleistä) ja niihin liittyi vaikea-asteista neutropeniaa noin 5,3 %:lla potilaista (1,1 %:ssa hoitosykleistä); ne johtivat 2 tapauksessa potilaan kuolemaan.

Anemiaa raportoitiin noin 58,7 %:lla potilaista (8 %:lla hemoglobiinipitoisuus oli < 80 g/dl ja 0,9 %:lla hemoglobiinipitoisuus oli < 65 g/dl).

Trombosytopeniaa (< 100 000 solua/mm³) havaittiin 7,4 %:lla potilaista ja 1,8 %:ssa hoitosykleistä; trombosyyttimääärä oli ≤ 50 000 solua/mm³ 0,9 %:lla potilaista ja 0,2 %:ssa hoitosykleistä.

Lähes kaikki potilaat olivat toipuneet päivään 22 mennessä.

Akuutti kolinerginen oireyhtymä

Vaikea-asteista ohimenevää akuuttia kolinergistä oireyhtymää havaittiin 9 %:lla monoterapiaa saaneista potilaista.

Astenia oli vaikea-asteista alle 10 %:lla monoterapiahoitoa saaneista potilaista. Syy-yhteyttä irinotekaaniin ei ole selvästi todettu.

Kuumetta ilman infektiota ja ilman samanaikaista vaikea-asteista neutropeniaa esiintyi 12 %:lla monoterapiahoitoa saaneista potilaista.

Laboratoriokokeet

Ohimenevää lievää tai keskivaikeaa seerumin transaminaasipitoisuuden (9,2 %:lla potilaista), alkalisen fosfataasipitoisuuden (8,1 %:lla potilaista) tai bilirubiinipitoisuuden (1,8 %:lla potilaista) suurenemista havaittiin ilman eteneviä maksametastaaseja.

Ohimenevää lievää tai keskivaikeaa seerumin kreatiniinipitoisuuden suurenemista havaittiin 7,3 %:lla potilaista.

YHDISTELMÄHOITO

Tässä kohdassa kuvatut haittavaikutukset viittaavat irinotekaaniin.

Sititä ei ole näyttöä, että setuksimabi vaikuttaisi irinotekaanin turvallisuusprofiiliin tai päinvastoin.

Yhdistelmähoidossa setuksimabin kanssa lisäksi raportoidut haittavaikutukset olivat sellaisia, joita voidaan olettaa esiintyvän setuksimabin käytön yhteydessä (kuten aknetyyppinen ihottuma 88 %:lla potilaista). Ks. irinotekaanin ja setuksimabin yhdistelmää koskevat haittavaikutustiedot näiden valmisteiden valmisteyhteenvedoista.

Haittavaikutukset, joita raportoitiin kapesitabiinin ja irinotekaanin yhdistelmää saaneilla potilailla kapesitabiinimonoterapian yhteydessä raportoitujen haittavaikutusten lisäksi tai näitä haittavaikutuksia yleisemmin, olivat mm.: *hyvin yleinen, kaikki vaikeusasteet: tromboosi/embolia; yleinen, kaikki vaikeusasteet: yliherkkyys, sydäniskemia/-infarkti; yleinen, vaikeusaste 3 ja vaikeusaste 4: kuumeinen neutropenia.* Kapesitabiinin täydelliset haittavaikutustiedot, ks. kapesitabiinin valmisteyhteenveto.

Vaikeusasteen 3 ja vaikeusasteen 4 haittavaikutukset, joita raportoitiin kapesitabiinia irinotekaanin ja bevasitsumabin kanssa yhdistelmänä saaneilla potilailla kapesitabiinimonoterapian yhteydessä raportoitujen haittavaikutusten lisäksi tai näitä haittavaikutuksia yleisemmin, olivat mm: *yleinen, vaikeusaste 3 ja vaikeusaste 4: neutropenia, tromboosi/embolia, korkea verenpaine ja sydäniskemia/-infarkti.* Kapesitabiinin ja bevasitsumabin täydelliset haittavaikutustiedot, ks. kapesitabiinin ja bevasitsumabin valmisteyhteenvedot.

Kun bevasitsumabi lisättiin bolusena annettavaan irinotekaanin/5-fluorourasiilin/foliinihapon yhdistelmään, vaikeusasteen 3 korkea verenpaine oli pääasiallinen merkittävä riski. Solunsalpaajahoidon vaikeusasteen 3/4 haittavaikutuksena esiintyneiden ripulin ja leukopenian esiintyytyden havaittiin lisäksi lisääntyneen hieman tässä hoidossa verrattuna potilaisiin, jotka saivat bolusena pelkästään irinotekaanin/5-fluorourasiilin/foliinihapon yhdistelmää. Muut tiedot bevasitsumabiyhdistelmähoidon haittavaikutuksista, ks. bevasitsumabin valmisteyhteenveto.

Irinotekaania on tutkittu metastasoidutta kolorektaalisypäätä sairastavilla potilailla yhdistelmänä 5-fluorourasiilin ja foliinihapon kanssa.

Kliinisiin tutkimuksiin perustuvat haittavaikutuksia koskevat turvallisuustiedot osoittavat hyvin yleisesti havaitut NCI-vaikeusasteen 3 tai 4 hoitoon mahdollisesti tai todennäköisesti liittyvät veren ja imukudoksen, ruoansulatuselimistön ja ihmisen ja ihonalaiskudoksen MedDRA-elinjärjestelmiä koskevat haittavaikutukset.

Seuraavia irinotekaanin antoon mahdollisesti tai todennäköisesti liittyneitä haittavaikutuksia on raportoitu 145 potilaalla, jotka saivat hoitona irinotekaania yhdistelmänä 5-fluorourasiilin ja foliinihapon kanssa suositusannoksina 180 mg/m² kerran kahdessa viikossa.

Irinotekaaniyhdistelmähoidon (180 mg/m ² kerran kahdessa viikossa) yhteydessä raportoidut haittavaikutukset		
MedDRA-elinjärjestelmä	Esiintyyvyys	Suositeltu termi
Infektiot	Yleinen	Infektio
Veri ja imukudos	Hyvin yleinen	Trombosytopenia
	Hyvin yleinen	Neutropenia
	Hyvin yleinen	Anemia
	Yleinen	Kuumiainen neutropenia
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	Hyvin yleinen	Heikentynyt ruokahalu
Hermosto	Hyvin yleinen	Kolinerginen oireyhtymä
Ruoansulatuselimistö	Hyvin yleinen	Ripuli
	Hyvin yleinen	Oksentelu
	Hyvin yleinen	Pahoinvointi
	Yleinen	Vatsakipu
	Yleinen	Ummetus
Iho ja ihonalainen kudos	Hyvin yleinen	Alopecia (korjautuva)
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	Hyvin yleinen	Limakalvotulehdus
	Hyvin yleinen	Astenia
	Yleinen	Kuume
Tutkimukset	Hyvin yleinen	Suurentunut transaminaasipitoisuus (ALAT ja ASAT)
	Hyvin yleinen	Suurentunut veren bilirubiinipitoisuus
	Hyvin yleinen	Suurentunut veren alkalisen fosfataasin pitoisuus

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus (yhdistelmähoito)

Vaikea-asteista ripulia havaittiin 13,1 %:lla potilaista, jotka noudattivat ripulin hoitoa koskevia suosituksia. Vaikea-asteista ripulia esiintyi 3,9 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä.

Vaikea-asteista **pahoinvointia ja oksentelua** havaittiin harvemmin (vaikea-asteista pahoinvointia 2,1 %:lla potilaista ja vaikea-asteista oksentelua 2,8 %:lla potilaista).

Irinotekaaniin ja/tai loperamidiin liittynytä **ummetusta** on havaittu 3,4 %:lla potilaista.

Neutropeniaa havaittiin 82,5 %:lla potilaista ja se oli vaikea-asteista (neutrofiilimäärä < 500 solua/mm³) 9,8 %:lla potilaista. Neutrofiilimäärä oli alle 1 000 solua/mm³ 67,3 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä, ja neutrofiilimäärä oli < 500 solua/mm³ 2,7 %:ssa arvioitavissa olleista hoitosykleistä. Neutrofiilimäärä korjautui tavallisesti täysin 7-8 päivässä.

Kuumeista neutropeniaa raportoitiin 3,4 %:lla potilaista ja 0,9 %:ssa hoitosykleistä.

Infektiota esiintyi noin 2 %:lla potilaista (0,5 %:ssa hoitosykleistä) ja niihin liittyi vaikea-asteista neutropeniaa noin 2,1 %:lla potilaista (0,5 %:ssa hoitosykleistä); ne johtivat 1 tapauksessa potilaan kuolemaan.

Anemiaa raportoitiin 97,2 %:lla potilaista (2,1 %:lla hemoglobiinipitoisuus oli < 8 g/dl).

Trombosytopeniaa (< 100 000 solua/mm³) havaittiin 32,6 %:lla potilaista ja 21,8 %:ssa hoitosykleistä.

Vaikea-asteista trombosytopeniaa ($\leq 50\ 000$ solua/mm³) ei havaittu.

Akuutti kolinerginen oireyhtymä Vaikea-asteinen ohimenevä akuutti kolinerginen oireyhtymä havaittiin 1,4 %:lla yhdistelmähoitoa saaneista potilaista.

Astenia oli vaikea-asteista 6,2 %:lla yhdistelmähoitoa saaneista potilaista. Syy-yhteyttä irinotekaaniin ei ole selvästi todettu.

Kuumetta ilman infektiota ja ilman samanaikaista vaikea-asteista neutropeniaa esiintyi 6,2 %:lla yhdistelmähoitoa saaneista potilaista.

Laboratoriokokeet Seerumin (vaikeusasteiden 1 ja 2) ALAT-arvon (15 %:lla potilaista) ja ASAT-arvon (11 %:lla potilaista), alkalisen fosfataasipitoisuuden (11 %:lla potilaista) tai bilirubiinipitoisuuden (10 %:lla potilaista) ohimenevä suurenemista havaittiin ilman eteneviä maksametastaaseja. Ohimenevää vaikeusasteen 3 seerumin ALAT-arvon (0 %:lla potilaista), ASAT-arvon (0 %:lla potilaista), alkalisen fosfataasipitoisuuden (0 %:lla potilaista) ja bilirubiinipitoisuuden (1 %:lla potilaista) suurenemista havaittiin. Vaikeusasteen 4 suurenemista ei havaittu.

Amylaasi- ja/tai lipaasipitoisuuden suurenemista on raportoitu hyvin harvoin.

Hypokalemiaa ja hyponatreemiaa on raportoitu harvinaisina tapauksina, ja niiden on raportoitu liittyneen lähinnä ripuliin ja oksenteluun.

MUUT KLIINISISSÄ TUTKIMUKSISSA VIKOITTAIN ANNETUN IRINOTEKAANIN YHTEYDESSÄ RAPORTOIDUT HAITTAVAIKUTUKSET

Irinotekaanilla tehdyyssä kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu lisäksi seuraavia lääkkeeseen liittyneitä tapahtumia: kipu, sepsis, peräsuolisairaus, maha-suolikanavan sieni-infekti, hypomagnesemia, ihottuma, iho-oireet, poikkeava kävely, sekavuus, päänsärky, synkopee, punastelu, bradykardia, virtsatieinfekti, rintojen kipu, suurentunut gammaglutamyltransferaasipitoisuus, ekstravasaatio ja tuumourilyyysisoireyhtymä, sydän- ja verisuonisairaus (angina pectoris, sydänpysähdy, sydäninfarkti, sydänlihasiskemia, ääreisverisuonisairaus, verisuonisairaus) ja tromboemboliset tapahtumat (valtimotromboosi, aivoinfarkti, aivooverenkiertohäiriö, syvä laskimotromboosi, perifeerinen embolia, keuhkoembolia, tromboflebiitti, tromboosi ja äkkikuolema) (ks. kohta 4.4.).

VALMISTEEN MARKKINOILLE TULON JÄLKEINEN SEURANTA

Valmisten markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa haittavaikutusten esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

MedDRA-elinjärjestelmä	Suositeltu termi
Infektiot	<ul style="list-style-type: none">PseudOMEMBRANOOTTINEN KOLIITTI, JOISTA YKSI TAPAUS ON BAKTERIOLOGISESTI DOKUMENTOITU (<i>Clostridium difficile</i>)SepsisSieni-infektiot*Virusinfektiot†
Veri ja imukudos	<ul style="list-style-type: none">Trombosytopenia, johon liittyy trombosyyttivasta-aineita
Immunijärjestelmä	<ul style="list-style-type: none">YliherkkyysAnafylaktinen reaktio
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	<ul style="list-style-type: none">ELIMISTÖN KUIVUMISTILA (RIPULIN TAI OKSENTELUN SEURAUKSENÄ)HYPOVOLEMIA

Hermosto	<ul style="list-style-type: none"> Puheen häiriöt, jotka ovat tavallisesti luonteeltaan ohimeneviä; tapahtuma liittyy joissakin tapauksissa kolinergiseen oireyhtymään, joka havaittiin irinotekaani-infusioon aikana tai pian sen jälkeen Parestesiat Tahaton lihasten supistelu
Sydän	<ul style="list-style-type: none"> Korkea verenpaine (infusioon aikana tai sen jälkeen) Sydämen ja verenkierron vajaatoiminta[‡]
Verisuonisto	<ul style="list-style-type: none"> Matala verenpaine[‡]
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina	<ul style="list-style-type: none"> Interstitiaalinen keuhkosairaus, joka ilmenee irinotekaanihoidon aikana melko harvoin keuhkoinfiltratteinä; varhaisvaiheen vaikutuksia, kuten hengenahdistusta, on raportoitu (ks. kohta 4.4). Hengenahdistus (ks. kohta 4.4) Hikka
Ruoansulatuselimistö	<ul style="list-style-type: none"> Suolitukos Ileus: ileustapauksia ilman edeltäävä koliitti on myös raportoitu Megakoolon Maha-suolikanavan verenvuoto Koliitti; koliittiin liittyi toisinaan komplisoivina tekijöinä haavaumia, verenvuoto, ileus tai infektio. Umpisuolitulehdus Iskeeminen koliitti Haavainen koliitti Haimaentsyymi坑itoisuuden oireinen tai oireeton suureneminen Suolen perforaatio
Maksa ja sappi	<ul style="list-style-type: none"> Rasvamaksatulehdus Maksan rasvoittuminen
Iho ja ihonalainen kudos	<ul style="list-style-type: none"> Ihoreaktio
Luusto, lihakset ja sidekudos	<ul style="list-style-type: none"> Lihaskrampit

Munuaiset ja virtsatiet	<ul style="list-style-type: none"> Munuaisten vajaatoiminta ja akuutti munuaisten vajaatoiminta yleensä potilailla, joilla on vaikeasteisesta mahasuolianavan toksisuudesta aiheutunut infektio ja/tai volyyymivaje[‡] Munuaisten vajaatoiminta[‡]
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	<ul style="list-style-type: none"> Infuusiokohdan reaktiot
Tutkimukset	<ul style="list-style-type: none"> Suurentunut amylaasipitoisuus Suurentunut lipaasipitoisuus Hypokalemia Hyponatremia, joka liittyy pääasiassa ripuliin ja oksenteluun Suurentuneita transaminaasipitoisuksia (eli ASAT ja ALAT) on raportoitu hyvin harvoin ilman eteneviä maksametastaaseja.

*esim. *Pneumocystis jirovecii* -keuhkokume, bronkopulmonaarinen aspergilloosi, systeeminen kandidoosi.
 †esim. *Herpes zoster*, influenssa, B-hepatiitin reaktivaatio, sytomegaloviruskoliitti.
[‡] Potilailla, joilla on esiintynyt ripuliin ja/tai oksenteluun liittyneitä elimistön kuivumistiloja tai sepsistä, on havaittu harvinaisia munuaisten vajaatoiminta-, hypotensio- ja sydän- ja verenkiertokollapsitapauksia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
 PL 55
 00034 Fimea

4.9 Yliannostus

Oireet

Yliannostustapauksia, joissa suositeltu hoitoannos on ylittynyt enintään noin kaksinkertaisesti, on ilmoitettu. Tällaiset annokset voivat olla kuolemaan johtavia. Ilmoitetusta haittavaikutuksista tärkeimmät olivat vakava neutropenia ja vakava ripuli.

Hoito

Irinotekaanille ei ole tunnettua vastalääkettä. Maksimaalinen elintoimintoja tukeva hoito on aloitettava ripulista johtuvan elimistön kuivumisen estämiseksi ja mahdollisten infektiokomplikaatioiden hoitamiseksi.

5. FARMAKOLOGISET OMNAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Antineoplastiset lääkkeet, topoisomeeraasi I: (TOP1) estääjä, ATC-koodi: L01CE02

Vaikutusmekanismi

Irinotekaani on puolisyyteettinen kamptotesiinin johdos. Se on antineoplastinen aine, joka spesifisesti estää DNA:n topoisomeraasi I:tä. Irinotekaani metaboloituu karboksyliesterasin vaikutuksesta useimmissa kudoksissa SN-38:ksi, joka on todettu irinotekaania aktiivisemmaksi puhdistetussa topoisomeraasi I:ssä ja irinotekaania sytotoksiseemmaksi useissa hiiren ja ihmisen kasvainsolulinoissa. DNA:n topoisomeraasi I:n esto irinotekaanilla tai SN-38:lla aiheuttaa yksiketjuisen DNA:n vaurioita, jotka salpaavat DNA:n replikaatiohaarukan ja aiheuttavat sytotoksisuuden. Tämä sytotoksinen aktiivisuus on todettu ajasta riippuvaiseksi ja S-faasispesifiseksi.

P-glykoproteiinin MDR ei tunnista irinotekaania eikä SN-38:aa merkittävässä määrin *in vitro*, ja irinotekaanilla ja SN-38:lla on sytotoksista aktiivisuutta doksorubisiini- ja vinblastiiniresistenttejä solulinjoja vastaan.

Irinotekaanilla on lisäksi laaja antituumorivaikutus *in vivo* hiiren kasvainmalleissa (P03 haimatiehyen adenokarsinooma, MA16/C nisän adenokarsinooma, C38 ja C51 koolonin adenokarsinoomat) ja ihmisen vieraslajisiirteissä (Co-4 koolonin adenokarsinooma, Mx-1 nisän adenokarsinooma, ST-15 ja SC-16 mahalaukun adenokarsinoomat). Irinotekaani on aktiivinen myös P-glykoproteiini MDR:ää ilmentävissä kasvaimissa (vinkristiinille ja doksorubisiinille resistentit P388-leukemiat).

Famakodynaamiset vaikutukset

Irinotekaanin antituumorivaikutuksen lisäksi sen tärkein farmakologinen vaikutus on asetyylikoliiniesteraasin esto.

Kliininen teho ja turvallisuus

Metastasoituneen kolorektaalikarsinooman ensilinjan yhdistelmähoito

Yhdistelmähoito foliinihapon ja 5-fluorourasiilin kanssa

Yhdessä vaiheen III tutkimuksessa 385:lle aiemmin hoitamattomalle potilaalle, joilla oli metastaattinen kolorektaalisypä, annettiin irinotekaania joko kahden viikon välein (ks. kohta 4.2) tai viikoittain. Kahden viikon välein toteutettavassa hoidossa annetaan ensimmäisenä päivänä ensin 180 mg/m^2 irinotekaania, liuosta varten, ja sitten infuusioina foliinihappoa (200 mg/m^2 kahden tunnin infuusiona laskimoon) ja 5-fluorourasiilia (400 mg/m^2 boluksena laskimoon ja sen jälkeen 600 mg/m^2 22 tunnin infuusiona laskimoon). Toisena päivänä foliinihappoa ja 5-fluorourasiilia annetaan samoina annoksina ja hoito-ohjelmina. Kerran viikossa toteutettavassa hoidossa annetaan 6 viikon ajan irinotekaania 80 mg/m^2 , ja sen jälkeen infuusiona foliinihappo (500 mg/m^2 kahden tunnin infuusiona laskimoon) ja sitten 5-fluorourasiili-infusio (2300 mg/m^2 24 tunnin infuusiona laskimoon).

Monilääkehoitotutkimuksessa, jossa käytettiin edellä kuvattuja kahta hoito-ohjelmaa, irinotekaanin tehoa arvioitiin 198 hoidetulla potilaalla:

	Yhdistelmähoito (n=198)		Viikoittainen annostus (n=50)		Annostus 2 viikon välein (n=148)	
	Irinotekaani +5-FU/FA	5-FU/FA	Irinotekaani +5-FU/FA	5-FU/FA	Irinotekaani +5-FU/FA	5-FU/FA
Vasteen saaneita (%)	40,8 *	23,1 *	51,2 *	28,6 *	37,5 *	21,6 *
p-arvo	<0,001		0,045		0,005	
Mediaaniaika taudin etenemiseen (kk)	6,7	4,4	7,2	6,5	6,5	3,7
p-arvo	<0,001		NS		0,001	
Vasteen mediaani kestoaika (kk)	9,3	8,8	8,9	6,7	9,3	9,5
p-arvo	NS		0,043		NS	
Vasteen mediaani kestoaika ja stabilisaatio (kk)	8,6	6,2	8,3	6,7	8,5	5,6
p-arvo	<0,001		NS		0,003	
Hoidon epäonnistumiseen kulunut mediaaniaika (kk)	5,3	3,8	5,4	5,0	5,1	3,0
p-arvo	0,0014		NS		<0,001	
Mediaani elossaoloaika (kk)	16,8	14,0	19,2	14,1	15,6	13,0
p-arvo	0,028		NS		0,041	

* protokollan mukaisen populaatioanalyysin mukaan; 5-FU = 5-fluorourasiili; FA = foliinihappo; NS = ei merkitsevä

Vakavaa ripulia esiintyi 44,4 %:lla potilaista, jotka saivat kerran viikossa annosteltuna yhdistelmähoiton irinotekaania yhdessä 5-FU/FA:n kanssa, ja 25,6 %:lla potilaista, joita on hoidettu pelkästään 5-FU/FA:lla. Vakavaa neutropeniaa (neutrofiilimäärä < 500 solua/mm³) esiintyi 5,8 %:lla potilaista, jotka saivat yhdistelmähoiton irinotekaania ja 5-FU/FA:ta, ja 2,4 %:lla potilaista, jotka saivat pelkästään 5-FU/FA:ta.

Lisäksi mediaaniaika toimintakyvyn selkeään huononemiseen oli irinotekaania saaneessa ryhmässä merkitsevästi pittempi kuin pelkkää 5-FU/FA:ta saaneessa ryhmässä ($p = 0,046$).

Elämänlaatua arvioitiin tässä vaiheen III tutkimuksessa EORTC QLQ-C30-kyselylomakkeella. Aika elämänlaadun selkeään huononemiseen oli yhdenmukaisesti pittempi irinotekaania saaneiden ryhmissä. Irinotekaania sisältänyttä yhdistelmähoitoa saaneiden ryhmässä yleinen terveydentila/elämänlaatu paranhieman, vaikkakaan ei merkitsevästi enemmän, mikä osoittaa, että irinotekaani oli monilääkehoidossa tehokas elämänlaatua heikentämättä.

Yhdistelmähoito bevasitsumabin kanssa

Kolmannen vaiheen satunnaistetussa, vaikuttavalla aineella kontrolloidussa klinisessä kaksoissokotkimuksessa arvioitiin bevasitsumabin ja irinotekaani/5-FU/FA:n yhdistelmähoitoa ensilinjan hoitona metastasotuneessa koolon- tai peräsuolikarsinoomassa (tutkimus AVF2107g). Bevasitsumabin lisääminen irinotekaani/5-FU/FA-yhdistelmään paransi kokonaisloonjäämistä tilastollisesti merkitsevästi. Kliininen hyöty, jota mitattiin kokonaisloonjäämisestä, todettiin kaikissa ennalta määritellyissä potilasalaryhmäissä, mukaan lukien ne, joissa potilaat oli määritelty iän, sukupuolen, toimintakyvyn asteen, primaarikasvaimen sijainnin, affisioituneiden elinten lukumäärän ja metastasotuneen taudin keston suhteen. Katso myös bevasitsumabin valmisteyleyteenveto.

Seuraavassa taulukossa on yhteenenveto AVF2107g-tutkimuksen tehoa koskevista tuloksista.

	AVF2107g	
	Hoitoryhmä 1 Irinotekaani/5-FU/FA + lume	Hoitoryhmä 2 Irinotekaani/5-FU/FA + bevasitsumabi^a
Potilaiden lukumäärä	411	402
Kokonaisloonjääminen		
Mediaaniaika (kk)	15,6	20,3
95 %:n luottamusväli	14,29 – 16,99	18,46 – 24,18
Riskisuhde ^b		0,660
p-arvo		0,00004
Progressioton eloonyhäminen (PFS)		
Mediaaniaika (kk)	6,2	10,6
Riskisuhde ^b		0,54
p-arvo		<0,0001
Kokonaisvaste		
Osuus (%)	34,8	44,8
95 %:n luottamusväli	30,2 – 39,6	39,9 – 49,8
p-arvo		0,0036
Vasteen kestoaika		
Mediaaniaika (kk)	7,1	10,4
25–75 persentiili (kk)	4,7 – 11,8	6,7 – 15,0

^a 5 mg/kg joka toinen viikko; ^b suhteessa verrokkiryhmään.

Yhdistelmähoito setuksimabin kanssa

EMR 62 202-013: Satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin setuksimabia yhdistettynä irinotekaaniin ja infusoitavaan 5-fluorourasiiliin/foliinihappoon (5-FU/FA) (599 potilasta) sekä samaa kemoterapiaa yksinään (599 potilasta) potilailla, joilla oli metastasoitunut kolorektaalisypä ja jotka eivät olleet saaneet aikaisemmin hoitoa metastaattiseen sairauteen. Niiden potilaiden, joiden kasvain ilmensi villityypin KRAS-geeniä, osuus oli 64 % siitä potilasryhmästä, jonka KRAS-tila voitiin määrittää. Alla olevassa taulukossa on yhteenenveto tutkimuksessa tehon osalta saaduista tuloksista:

Muuttuja/tunnusluku	Kokonaisryhmä		Villityypin KRAS-geeniä ilmentävä ryhmä	
	Setuksimabi + FOLFIRI (N = 599)	FOLFIRI (N = 599)	Setuksimabi + FOLFIRI (N = 172)	FOLFIRI (N = 176)
ORR				
% (95 % CI)	46,9 (42,9; 51,0)	38,7 (34,8; 42,8)	59,3 (51,6; 66,7)	43,2 (35,8; 50,9)
p-arvo		0,0038		0,0025
PFS				
Riskisuhde (95 % CI)	0,85 (0,726; 0,998)		0,68 (0,501; 0,934)	
p-arvo		0,0479		0,0167

CI = confidence interval eli luottamusväli; FOLFIRI = irinotekaani yhdessä infusoitavan 5-FU/FA:n kanssa; ORR = objective response rate eli objektiivinen vaste (potilaat, joilla oli täydellinen vaste tai osittainen vaste); PFS = progression-free survival time eli etenemisvapaa elinaika

Yhdistelmähoito kapesitabiinin kanssa

Satunnaistetusta, kontrolloidusta faasin III tutkimuksesta (CAIRO) saadut tiedot tukevat kapesitabiinin (aloitusannos 1 000 mg/m² kahden viikon ajan kolmen viikon välein) ja irinotekaanin yhdistelmän käyttöä metastasoidutta kolorektaalisyöpää sairastavien potilaiden ensilinjan hoitona.

Kahdeksansataakaksikymmentä (820) potilasta satunnaistettiin saamaan joko jaksottaisista hoitoa (n = 410) tai yhdistelmähoitoa (n = 410). Potilaat saivat jaksottaisessa hoito-ohjelmassa ensilinjan hoitona kapesitabiinia (1 250 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan), toisen linjan hoitona irinotekaania (350 mg/m² päivänä 1) ja kolmannen linjan hoitona kapesitabiinin (1 000 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan) ja oksaliplatiinin (130 mg/m² päivänä 1) yhdistelmää. Yhdistelmähoito koostui ensilinjan hoitona käytetyistä kapesitabiinin (1 000 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan) ja irinotekaanin (250 mg/m² päivänä 1) yhdistelmästä (XELIRI) ja toisen linjan hoitona annetusta kapesitabiinin (1 000 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan) ja oksaliplatiinin (130 mg/m² päivänä 1) yhdistelmähoidosta. Kaikkia hoitosyklejä annettiin kolmen viikon välein. Intent-to-treat-ryhmän ensilinjan hoidossa taudista vapaa eloontajaamisen mediaani oli kapesitabiini-monoterapien yhteydessä 5,8 kuukautta (95 %:n luottamusväli 5,1 – 6,2 kuukautta) ja XELIRI-hoidon yhteydessä 7,8 kuukautta (95 %:n luottamusväli, 7,0 – 8,3 kuukautta, p = 0,0002).

Satunnaistetun kontrolloidun faasin II monikeskustutkimuksen (AIO KRK 0604) välianalyysista saadut tiedot tukevat kapesitabiinin (aloitusannos 800 mg/m² kahden viikon ajan kolmen viikon välein), irinotekaanin ja bevasitumabin yhdistelmän käyttöä ensilinjan hoitona metastasoidutta kolorektaalisyöpää sairastavien potilaiden hoitoon. Sataviisitoista (115) potilasta satunnaistettiin hoitoon kapesitabiinin, irinotekaanin (XELIRI) ja bevasitumabin yhdistelmällä: kapesitabiini (800 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 2 viikon ajan, jota seuraa 7 vuorokauden tauko), irinotekaani (200 mg/m² 30 minuutin kestoisena infuusiona päivänä 1 kolmen viikon välein) ja bevasitumabi (7,5 mg/kg 30 – 90 minuutin kestoisena infuusiona päivänä 1 kolmen viikon välein). Yhteensä 118 potilasta satunnaistettiin saamaan hoitoa kapesitabiinin, oksaliplatiinin ja bevasitumabin yhdistelmällä: kapesitabiini (1 000 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa 2 viikon ajan, jota seuraa 7 vuorokauden tauko), oksaliplatiini (130 mg/m² kahden tunnin kestoisena infuusiona päivänä 1 kolmen viikon välein) ja bevasitumabi (7,5 mg/kg 30 – 90 minuutin kestoisena infuusiona päivänä 1 kolmen viikon välein).

Intent-to-treat-ryhmän taudista vapaa eloontajaaminen oli kuuden kuukauden hoidon jälkeen 80 % (XELIRI-hoidon ja bevasitumabin yhdistelmä) verrattuna 74 %:iin (XELOX-hoidon ja bevasitumabin yhdistelmä). Kokonaivaste (täydellinen vaste ja osittainen vaste) oli 45 % (XELOX-hoidon ja bevasitumabin yhdistelmä) verrattuna 47 %:iin (XELIRI-hoidon ja bevasitumabin yhdistelmä).

Monoterapia metastaattisen kolorektaalisyön toisen linjan hoidossa

Toisen ja kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin osallistui yli 980 potilasta, joilla oli metastaattinen kolorektaalisyöpä (lääkeannos joka kolmas viikko) ja joilla aiempi 5-FU-hoito ei ollut tehonnut. Irinotekaanin tehoa arvioitiin 765 potilaalla, joilla tauti eteni dokumentoidusti 5-FU-hoidon aikana tutkimukseen otettaessa.

Faasin III tutkimukset	Irinotekaani vs. tukihoito			Irinotekaani vs. 5-FU		
	Irinotekaani n = 183	Tukihoito n = 90	p-arvo	Irinotekaani n = 127	5-FU n = 129	p-arvo
Progressioton eloonjääminen 6 kk kohdalla (%)	NA	NA		33,5*	26,7	0,03
Eloonjääminen 12 kk kohdalla (%)	36,2*	13,8	0,0001	44,8*	32,4	0,0351
Mediaani eloonjääminen (kk)	9,2*	6,5	0,0001	10,8*	8,5	0,0351

*tilastollisesti merkitsevä ero; NA: ei määriteltävissä

Toisen vaiheen tutkimuksissa, joissa 455 potilasta sai lääkeannoksen kolmen viikon välein, elossa ilman taudin etenemistä oli 6 kuukauden kuluttua 30 % ja elossaoloaika oli 9 kuukautta (mediaani). Aika taudin etenemiseen oli 18 viikkoa (mediaani).

Lisäksi tehtiin ei-vertailevia toisen vaiheen tutkimuksia, joissa 304 potilaalle infusoitiin 125 mg/m² irinotekaania laskimoon 90 minuutin aikana kerran viikossa neljänä peräkkäisenä viikkona, minkä jälkeen seurasi 2 viikon hoitotauko. Näissä tutkimuksissa aika taudin etenemiseen oli 17 viikkoa (mediaani) ja elossaoloaika 10 kuukautta (mediaani).

Samankaltainen turvallisuusprofiili todettiin viikoittaisessa lääkeannosohjelmassa, jossa 193 potilaalle annettiin aloitusannoksesta 125 mg/m² verrattuna kolmen viikon välein annettuun annokseen. Ensimmäinen ripuliuloste ilmeni 11:ntenä päivänä (mediaani).

Yhdistelmähoito setuksimabin kanssa kun irinotekaania sisältävä solunsalpaajahoito on epäonnistunut

Setuksimabin ja irinotekaanin yhdistelmähoidon tehoa on tutkittu kahdessa kliinisessä tutkimuksessa. Yhdistelmähoitoa annettiin yhteensä 356 potilaalle, joilla oli epidermaalisen kasvutekijän_reseptoria ilmentävä metastasoinut kolorektaalisypä, joiden irinotekaania sisältänyt_solunsalpaajahoito oli äskettään epäonnistunut ja joiden Karnofsky-toimintakykypisteet olivat_vähintään 60, suurimmalla osalla kuitenkin ≥ 80.

EMR 62 202-007: Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin setuksimabin ja irinotekaanin yhdistelmähoitoa (218 potilasta) pelkkään setuksimabihoitoon (111 potilasta).

IMCL CP02-9923: Tässä yhden hoitoryhmän avoimessa tutkimuksessa tutkittiin yhdistelmähoitoa 138 potilaalla.

Seuraavassa taulukossa on yhteenvetö näiden tutkimusten tehoa koskevista tuloksista:

Tutkimus	n	ORR		DCR		PFS (kk)		OS (kk)	
		n (%)	95 % CI	n (%)	95 % CI	Mediaani	95 % CI	Mediaani	95 % CI
Setuksimabi + irinotekaani									
EMR 62 202-007	218	50 (22,9)	17,5; 29,1	121 (55,5)	48,6; 62,2	4,1	2,8; 4,3	8,6	7,6; 9,6
IMCL CP02-9923	138	21 (15,2)	9,7; 22,3	84 (60,9)	52,2; 69,1	2,9	2,6; 4,1	8,4	7,2; 10,3
Setuksimabi									
EMR 62 202-007	111	12 (10,8)	5,7; 18,1	36 (32,4)	23,9; 42,0	1,5	1,4; 2,0	6,9	5,6; 9,1

CI = luottamusväli; DCR = potilaat, joilla sairaus saatiiin hallintaan (potilaat, joilla saavutettiin täydellinen hoitovaste, osittainen hoitovaste tai taudin stabilisaatio vähintään 6 viikoksi); ORR = potilaat, joilla saavutettiin objektiivinen hoitovaste (potilaat, joilla saavutettiin täydellinen tai osittainen hoitovaste); OS = kokonaisloonjääminen; PFS = progressiiton eloonjääminen

Setuksimabin ja irinotekaanin yhdistelmähoidon teho oli setuksimabi-yksiläkehoitoa parempi objektiivisten hoitovasteiden (ORR) määrässä, niiden potilaiden määrässä, joilla tauti saatiiin hallintaan (DCR) sekä progressiottoman eloonjäämisen (PFS) ajan mediaanin suhteen. Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa ei osoitettu vaikutuksia kokonaisloonjäämiseen (riskisuhde 0,91, p = 0,48).

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Kun käytettiin suositusannostusta 350 mg/m², infuusion päätyessä irinotekaanin huippupitoisuus plasmassa oli keskimäärin 7,7 mikrog/ml ja SN-38:n 56 ng/ml sekä irinotekaanin AUC-arvo oli keskimäärin 34 mikrog·h/ml ja SN-38:n 451 ng·h/ml. SN-38:n farmakokineettiset parametrit vaihtelevat yleensä huomattavasti yksilöiden välillä.

Jakautuminen

Vaiheen I tutkimuksessa, jossa 60 potilaalle annettiin irinotekaania 100-750 mg/m² infuusiona laskimoon 30 minuutin aikana 3 viikon välein, jakautumistilavuus oli vakaassa tilassa (V_{ss}) 157 l/m².

Irinotekaanin sitoutuminen plasman proteiineihin *in vitro* oli noin 65 % ja SN-38:n 95 %.

Biotransformaatio

¹⁴C-merkityn lääkeaineen massa-tasapaino- ja metabolismitutkimukset ovat osoittaneet, että yli 50 % laskimoon annostusta irinotekaaniannoksesta erittyy muuttumattomana lääkeaineena, 33 % ulosteeseen pääasiassa sapen kautta ja 22 % virtsaan.

Seuraavat kaksi metaboliareittiä metaboloivat kumpikin vähintään 12 % annoksesta:

- Karboksyliesteraasin välittämä hydrolyysi aktiiviseksi SN-38-metabolitiiksi, joka eliminoituu pääasiassa glukuronidaation kautta ja erittyy sitten sapen ja munuaisten kautta (alle 0,5 % irinotekaaniannoksesta). SN-38-glukuronidi todennäköisesti hydrolysoituu edelleen suolessa.
- Sytokromi P450 3A -entsyymimestä riippuvaiset hapettumiset johtavat ulomman piperidiinirenkaan aukeamiseen ja aminopentanohappojohdoksen (APC) ja primaarisen amiinijohdoksen (NPC) muodostumiseen (ks. kohta 4.5).

Muuttumatonta irinotekaania on eniten plasmassa, seuraavaksi APC:tä, SN-38-glukuronidia ja SN-38:aa. Vain SN-38:lla on merkittävä sytotoksista aktiivisuutta.

Eliminaatio

Irinotekaani poistui elimistöstä joko kaksi- tai kolmivaiheisesti ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa, jossa 60 potilaalle infusoitiin 100–750 mg/m² irinotekaania laskimoon 30 minuutin aikana kolmen viikon välein. Plasmapuhdistuma oli keskimäärin 15 l/h/m². Keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa oli kolmivaihemallin ensimmäisessä vaiheessa 12 minuuttia, toisessa vaiheessa 2,5 tuntia ja viimeisessä vaiheessa 14,2 tuntia. SN-38 poistui elimistöstä kaksivaiheisesti siten, että viimeisen vaiheen eliminaation puoliintumisaika oli keskimäärin 13,8 tuntia.

Irinotekaanipuhdistuma pienenee noin 40 %, jos potilaan bilirubinemia on 1,5-3 kertaa suurempi kuin bilirubiinin viitearvojen yläraja. Näillä potilailla irinotekaaniannos 200 mg/m² johtaa vastaavaan lääkeainealtistukseen plasmassa kuin annos 350 mg/m² syöpätilalla, joilla on normaalit maksa-arvot.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Irinotekaanin farmakokineettinen väestöanalyysi on tehty 148 potilaalla, joilla oli metastaattinen kolorektaalisypä ja joita oli hoidettu erilaisilla hoito-ohjelmilla ja annoksilla vaiheen II tutkimuksissa. Kolmitilamallilla arvioidut farmakokineettiset parametrit olivat samanlaiset kuin vaiheen I tutkimuksissa. Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että altistus irinotekaanille ja SN-38:lle lisääntyy suhteessa annettuun irinotekaaninannokseen. Niiden farmakokinetikka ei riipu aiempien hoitokertojen lukumäärästä eikä hoito-ohjelmasta.

Farmakokineettiset/farmakodynamiset suhteet

Tärkeimpien toksisten vaikutusten (esim. leukoneutropenia ja ripuli) voimakkuus irinotekaanihoidon aikana on suhteessa altistukseen (AUC) kanta-aineelle ja SN-38-metaboliitille. Hematotoksisuuden (valkosolumäärän lasku ja pienin neutrofilimäärä) tai ripulin vaikeusasteen todettiin korreloivan merkittävästi sekä irinotekaanin että SN-38-metaboliitin AUC-arvojen kanssa yksilääkehoidossa.

UGT1A1-entsymin vähentynyt aktiivisuus:

Uridiinidifosfaattiglukuronosyyltransferaasi 1A1 (UGT1A1) -entsyymi osallistuu irinotekaanin aktiivisen metaboliitin SN-38:n deaktivaatioon inaktiiviseksi SN-38-glukuronidiksi (SN-38G). UGT1A1-geeni on erittäin polymorfinen, minkä vuoksi yksilöiden välillä esiintyy vaihtelua metaboliakyvyssä. UGT1A1-geenin tunnusomaismat variantit ovat UGT1A1*28 ja UGT1A1*6. Näihin variantteihin ja muihin synnynnäisiin UGT1A1-geenin ilmentymän puutoksiin (kuten Gilbertin ja Crigler-Najjarin oireyhtymiin) liittyy tämän entsymin vähentynyt aktiivisuus.

Hitailla UGT1A1-metabolojilla (esim. homotsygoottinen varianttien UGT1A1*28 tai UGT1A1*6 suhteeseen) on suurentunut vakavan neutropenian ja ripulin riski irinotekaanihoidon jälkeen SN-38:n kertymisen seurauksena. Useiden meta-analyysien tietojen perusteella riski on suurentunut potilailla, joille annettavat irinotekaaninannokset ovat $> 180 \text{ mg/m}^2$ (ks. kohta 4.4).

UGT1A1-genotyypitystä voidaan käyttää niiden potilaiden tunnistamiseen, joilla on suurentunut vakavan neutropenian ja ripulin riski. UGT1A1*28-alleelin suhteen homotsygoottisuuden esiintvyys on 8–20 % Euroopan, Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän väestöllä. Variantti UGT1A1*6 on lähes olematon näissä ihmisyryhmissä. Itä-Aasian väestössä *28/*28:n esiintvyys on noin 1–4 %, *6/*28:n 3–8 % ja *6/*6:n 2–6 %. Keski- ja Etelä-Aasian väestössä *28/*28:n esiintvyys on noin 17 %, *6/*28:n 4 % ja *6/*6:n 0,2 %.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Irinotekaani ja SN-38 on todettu mutageenisiksi *in vitro* -kromosomiaberraatiokokeessa kiinanhamsterin munasarjasoluilla sekä *in vivo* -mikrotumakokeessa hiirellä. Niillä ei kuitenkaan todettu mutageenista potentiaalia Amesin testissä.

Rotilla, jotka saivat enimmäisannoksen 150 mg/m^2 (mikä on vähemmän kuin puolet ihmisen suositusannoksesta) kerran viikossa 13 viikon ajan, ei todettu hoitoon liittyviä kasvaimia 91 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Irinotekaanin kerta-annoksen ja toistuvan annostelun toksisuutta on tutkittu hiirellä, rotalla ja koiralla. Tärkeimmat toksiset vaikutukset todettiin hematopoieettisessa ja lymfaattisessa järjestelmässä. Koiralla ilmoitettiin viivästyneeseen ripuliin liittyvinä suolen limakalvon surkastuneisuutta ja fokaalista nekroosia. Koirilla todettiin myös karvanlähtöä. Näiden vaikutusten vakavuusaste riippui annoksesta ja vaikutukset olivat palautuvia.

Lisääntyminen

Irinotekaani oli teratogenista rotilla ja kaneilla ihmisen terapeutisia annoksia pienemmillä annoksilla. Irinotekaanilla hoidettujen rottien poikasilla, joilla oli ulkoisia poikkeavuuksia, hedelmällisyys heikkeni. Tätä ei havaittu morfologisesti normaaleilla poikasilla. Tiineillä rotilla istukan paino pieneni sekä jälkeläisten sikiöiden elinkykyisyys heikkeni ja poikkeava käyttäytyminen lisääntyi.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Sorbitoli (E 420)
Maitohappo
Natriumhydroksidi (pH:n säätöön tasolle 3,5)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

Laimennettu lääkevalmiste (infuusioliuos)

0,9-prosenttiseen keittosuolaliukseen tai 5-prosenttiseen glukoosiliukseen laimentamisen jälkeen valmisteen käytön aikaisen kemiallisen ja fysikaalisen stabiiliuden on osoitettu säilyvän 6 tunnin ajan huoneen lämmössä (noin 25 °C) ja ympäristön normaalivalaistuksessa tai 48 tunnin ajan jos valmiste säilytetään kylmässä (noin 2–8 °C).

Infuusoliuos on mikrobiologista syistä käytettävä heti laimentamisen jälkeen. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytsajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti ylitä 6 tuntia huoneen lämmössä tai 24 tuntia, jos säilytyslämpötila on 2–8 °C, ellei laimentaminen ole suoritettu valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

6.4 Säilytys

Ei saa jäätää.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisten säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Irinotecan medac 40 mg:

2 ml:n ruskea lasinen injektiopullo, joka on suljettu halobutylkumitulpalla, joka on sisäpuolelta päälystetty inertillä fluoropolymeerilla. Yhden injektiopullon pakaus.

Irinotecan medac 100 mg:

5 ml:n ruskea lasinen injektiopullo, joka on suljettu halobutylkumitulpalla, joka on sisäpuolelta päälystetty inertillä fluoropolymeerilla. Yhden injektiopullon pakaus.

Irinotecan medac 300 mg:

15 ml:n ruskea lasinen injektiopullo, joka on suljettu halobutyylikumitulpalla, joka on sisäpuolelta päälystetty inertillä fluoropolymeerilla. Yhden injektiopullon pakaus.

Irinotecan medac 500 mg:

25 ml:n ruskea lasinen injektiopullo, joka on suljettu halobutyylikumitulpalla, joka on sisäpuolelta päälystetty inertillä fluoropolymeerilla. Yhden injektiopullon pakaus.

Irinotecan medac 1000 mg:

50 ml:n ruskea lasinen injektiopullo, joka on suljettu halobutyylikumitulpalla, joka on sisäpuolelta päälystetty inertillä fluoropolymeerilla. Yhden injektiopullon pakaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Irinotecan medac, kuten muutkin antineoplastiset lääkeaineet, täytyy valmistaa ja käsittää huolellisesti. Suojalasien, kasvomaskin ja suojakäsineiden käyttäminen on vältämätöntä.

Jos Irinotecan medac infuusiokonsentraatti, liuosta varten, tai valmistettu infuusioluos joutuu kontaktiin ihmisen kanssa, pese iho välittömästi ja huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos Irinotecan medac infuusiokonsentraatti, liuosta varten, tai valmistettu infuusioluos joutuu kontaktiin limakalvojen kanssa, pese limakalvet vedellä välittömästi.

Laskimoon annettavan liuoksen valmistaminen

Kuten mitkä tahansa muutkin injisoitavat lääkevalmisteet, Irinotecan medac infuusiokonsentraatti, liuosta varten, tulee valmistaa aseptisesti (ks. kohta 6.3).

Jos injektiopulloissa tai laimentamisen jälkeen havaitaan vähänkään sakkautumista, valmiste on hävitettävä sytotoksisten aineiden hävittämistä koskevien tavanomaisten ohjeiden mukaisesti.

Vedä tarvittava määrä Irinotecan medac infuusiokonsentraattia, liuosta varten, kalibroidulla ruiskulla aseptisesti injektiopullossa ja injisoi 250 ml:n infuusiopussiin tai -pulloon, joka sisältää joko 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta tai 5-prosenttista glukoosiliuosta. Infuusioluos tulee sen jälkeen sekoittaa huolellisesti käsin pyörittämällä.

Hävittäminen

Käytämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Vain kertakäyttöön.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

24766

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 01 heinäkuuta 2009
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 05 tammikuuta 2018

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

02.02.2023

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En milliliter koncentrat till infusionsvätska, lösning, innehåller 20 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat, motsvarande 17,33 mg irinotekan.

Varje injektionsflaska på 2 ml innehåller 40 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat (40 mg/2 ml).

Varje injektionsflaska på 5 ml innehåller 100 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat (100 mg/5 ml).

Varje injektionsflaska på 15 ml innehåller 300 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat (300 mg/15 ml).

Varje injektionsflaska på 25 ml innehåller 500 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat (500 mg/25 ml).

Varje injektionsflaska på 50 ml innehåller 1000 mg irinotekanhdrokloridtrihydrat (1000 mg/50 ml).

Hjälvpännen med känd effekt

Sorbitol (E 420)

Detta läkemedel innehåller 45 mg sorbitol per ml.

För fullständig förteckning över hjälvpännen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

En klar, gul lösning.

pH 3,0 – 3,8

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Irinotecan medac är indicerat för behandling av patienter med avancerad kolorektal cancer:

- i kombination med 5-fluorouracil och folinsyra till patienter utan tidigare kemoterapi för avancerad sjukdom.
- som monoterapi till patienter som har sviktat på etablerad 5-fluorouracilinnehållande behandlingsregim.

Irinotecan medac i kombination med cetuximab är indicerat för behandling av patienter med KRAS wild-type metastatisk kolorektalcancer som uttrycker epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) efter svikt av irinotekaninnehållande cytotoxisk behandling (se avsnitt 5.1).

Irinotecan medac i kombination med 5-fluorouracil, folinsyra och bevacizumab är indicerat som förstahandsbehandling av patienter med metastatiskt karcinom i kolon eller rektum.

Irinotecan medac i kombination med kapecitabin med eller utan bevacizumab är avsett som förstahandsbehandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Endast för vuxna. Irinotekan som infusionsvätska, lösning, ska efter spädning infunderas i en perifer eller central ven.

Rekommenderad dos:

Som monoterapi (till tidigare behandlade patienter)

Den rekommenderade dosen av irinotekan är 350 mg/m² administrerad som intravenös infusion under 30 – 90 minuter var 3:e vecka (se avsnitt 4.4 och 6.6).

Som kombinationsbehandling (till tidigare obehandlade patienter)

Säkerhet och effekt av irinotekan i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och folinsyra har utvärderats med följande schema (se avsnitt 5.1).

- Irinotekan plus 5-FU/folinsyra enligt tvåveckorsschema

Den rekommenderade dosen av irinotekan är 180 mg/m² administrerad en gång varannan vecka som intravenös infusion under 30 – 90 minuter, följd av infusion med folinsyra och 5-fluorouracil.

För dosering och administreringssätt vid kombinationsbehandling med cetuximab, se produktresumén för detta läkemedel.

Vanligtvis ges samma irinotekandos som under de senaste cyklerna av den tidigare irinotekaninnehållande behandlingen. Irinotekan får inte administreras tidigare än 1 timme efter avslutad cetuximabinfusion.

För dosering och administreringssätt för bevacizumab, se produktresumén för bevacizumab.

För dosering och administreringssätt för kombinationsbehandling med kapecitabin, se avsnitt 5.1 och aktuella avsnitt i produktresumén för kapecitabin.

Dosjusteringar:

Irinotekan bör ges när tillfredsställande återhämtning har skett av samtliga biverkningar till grad 0 eller 1 på NCI-CTC-skalan (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) och behandlingsrelaterad diarré har upphört helt.

När nästa infusionsbehandling ska påbörjas, bör dosen av irinotekan, och i förekommande fall av 5-FU, sänkas i enlighet med den svåraste graden av de biverkningar som observerats efter föregående infusion. Behandlingen bör skjutas upp i 1 – 2 veckor för att tillåta återhämtning från behandlingsrelaterade biverkningar.

Följande biverkningar bör medföra en dosreduktion på 15 – 20 % för irinotekan och/eller 5-FU i förekommande fall:

- hematologisk toxicitet (neutropeni grad 4, neutropeni med feber [neutropeni grad 3 – 4 och feber grad 2 – 4], trombocytopeni och leukopeni [grad 4]).
- icke-hematologisk toxicitet (grad 3 – 4).

Rekommendationer för dosjustering av cetuximab vid kombinationsbehandling med irinotekan måste följas i enlighet med produktinformationen för detta läkemedel.

I kombination med kapecitabin för patienter 65 år eller äldre rekommenderas en sänkning av startdosen för kapecitabin till 800 mg/m² två gånger dagligen i enlighet med produktresumén för kapecitabin. Se även de

rekommendationer om dosjustering vid kombinationsbehandling som lämnas i produktresumén för kapecitabin.

Behandlingsduration:

Behandling med irinotekan bör fortsätta till dess att en objektiv progression av sjukdomen eller oacceptabel toxicitet föreligger.

Speciella patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Vid monoterapi: Bilirubinnivån i blodet (upp till 3 gånger det övre normalvärdet) hos patienter med allmäntillstånd enligt WHO ≤ 2 bör bestämma startdosen av irinotekan. Hos dessa patienter med hyperbilirubinem och en protrombintid mer än 50 %, är clearance av irinotekan minskad (se avsnitt 5.2) och därför är risken för hematologisk toxicitet ökad. Därför bör fullständig blodbild bestämmas varje vecka för denna patientgrupp.

- Hos patienter med bilirubinvärden upp till 1,5 gånger det övre normalvärdet är den rekommenderade dosen av irinotekan 350 mg/m^2 .
- Hos patienter med bilirubinvärden mellan 1,5 och 3 gånger det övre normalvärdet är den rekommenderade dosen av irinotekan 200 mg/m^2 .
- Patienter med ett bilirubinvärde som är mer än 3 gånger det övre normalvärdet ska inte behandlas med irinotekan (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som fått kombinationsbehandling med irinotekan.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Irinotekan rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion, eftersom studier på denna patientgrupp saknas (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Äldre

Inga specifika farmakokinetiska studier har genomförts på äldre patienter. Dosen till dessa patienter ska dock väljas med omsorg, då nedsatta biologiska funktioner är vanligare hos äldre. Denna patientgrupp bör övervakas mer noggrant (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för irinotekan för barn har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

- Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och/eller tarmobstruktion (se avsnitt 4.4).
- Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmämne som anges i avsnitt 6.1.
- Amning (se avsnitt 4.4 och 4.6).
- Bilirubinvärde > 3 gånger det övre normalvärdet (se avsnitt 4.4).

- Allvarlig benmärgssvikt.
- Allmäntillstånd enligt WHO > 2.
- Samtidig användning av preparat innehållande johannesört (se avsnitt 4.5).
- Levande försvagade vacciner (se avsnitt 4.5)

För ytterligare kontraindikationer gällande cetuximab, bevacizumab och kapecitabin, se produktinformationen för dessa läkemedel.

4.4 Varningar och försiktighet

Användning av irinotekan ska endast ske på enheter som är specialiserade på administrering av cytotoxisk kemoterapi och läkemedlet ska endast administreras under överinseende av läkare med specialistkompetens inom kemoterapeutisk cancerbehandling.

Med hänsyn till biverkningarnas art och frekvens, ska irinotekan endast förskrivas i följande fall, efter att den förväntade nyttan vägts mot de möjliga riskerna med behandlingen:

- till patienter som har en riskfaktor, särskilt de med allmäntillstånd enligt WHO = 2.
- i de sällsynta fall där det bedöms att patienten troligen ej kommer att följa anvisningarna för hantering av biverkningar (behov av omedelbar och förlängd antidiarrébehandling kombinerad med högt vätskeintag vid uppkomst av födröjd diarré). Strikt övervakning på sjukhus rekommenderas för dessa patienter.

När irinotekan används som monoterapi, ordinaras vanligen dosering var 3:e vecka. Emellertid kan dosering varje vecka (se avsnitt 5) övervägas hos patienter som behöver noggrann uppföljning eller som har särskilt hög risk för svår neutropeni.

Födröjd diarré

Patienterna ska uppmärksammas på risken för födröjd diarré, som kan inträffa mer än 24 timmar efter administrering av irinotekan och när som helst fram till nästa behandlingscykel. Vid monoterapi var mediantiden till den första flytande avföringen 5 dagar efter infusion med irinotekan. Patienterna ska snarast informera sin läkare om att de har fått diarré och omedelbart påbörja lämplig behandling.

Patienter med ökad risk för diarré är de som tidigare har fått strålbehandling av buk eller bäcken, de som initialt har hyperleukocytos, de som har ett allmäntillstånd enligt WHO ≥ 2 samt kvinnor. Utan adekvat behandling kan diarrén vara livshotande, framför allt hos patienter med samtidig neutropeni.

Så snart som den första flytande avföringen inträffar ska patienten börja dricka stora mängder vätska som innehåller elektrolyter, och adekvat behandling mot diarré måste påbörjas omedelbart. Denna antidiarrébehandling bör ordinaras av den avdelning som administrerat irinotekan. Efter utskrivning från sjukhuset bör patienterna få de ordinerade läkemedlen så att de kan behandla diarrén så fort den uppkommer. Dessutom måste patienten informera sin läkare eller den avdelning som administrerat irinotekan när/om diarré uppkommer.

Nuvarande rekommenderad behandling mot diarré består av höga doser av loperamid (4 mg som första dos och därefter 2 mg varannan timme). Denna behandling bör fortsätta i 12 timmar efter den sista flytande avföringen och bör inte ändras. I inget fall bör loperamid ges i mer än 48 timmar i följd i dessa doser, på grund av risken för paralytisk ileus, och inte heller kortare tid än 12 timmar.

Förutom behandling mot diarré, bör profylaktisk behandling med ett bredspektrumantibiotikum ges om diarrén åtföljs av svår neutropeni (neutrofilantal < 500 celler/mm³).

Förutom antibiotikabehandling rekommenderas sjukhusvård för behandling av diarré i följande fall:

- om diarrén åtföljs av feber.
- vid svår diarré (som kräver intravenös hydrering).
- om diarrén fortsätter i mer än 48 timmar efter påbörjad behandling med loperamid i hög dos.

Loperamid bör inte ges profylaktiskt, inte ens till patienter som har haft fördröjd diarré under tidigare cykler.

Hos patienter som har fått svår diarré, rekommenderas sänkt dos vid följande cykler (se avsnitt 4.2).

Hematologi

I kliniska studier var frekvensen av neutropeni av NCI CTC-grad 3 och 4 signifikant högre hos patienter som tidigare fått strålbehandling mot bäcken eller buk än hos patienter som inte fått sådan strålbehandling.

Patienter med totala bilirubinnivåer i serum vid behandlingsstart på 1,0 mg/dl eller mer hade också signifikant större sannolikhet att drabbas av neutropeni av grad 3 eller 4 under den första cykeln än patienter med bilirubinnivåer som var lägre än 1,0 mg/dl.

Kontroll med fullständig blodkroppsräkning varje vecka rekommenderas under behandling med irinotekan. Patienterna bör uppmärksammas på risken för neutropeni och betydelsen av feber. Neutropeni med feber (temperatur > 38 °C och neutrofilantal ≤ 1 000 celler/mm³) bör behandlas akut på sjukhus med intravenösa bredspektrumantibiotika.

Hos patienter som har fått svåra hemotologiska biverkningar rekommenderas en dosreduktion vid påföljande administrering (se avsnitt 4.2).

Det föreligger ökad risk för infektioner och hematologisk toxicitet hos patienter med svår diarré. Hos patienter med svår diarré bör kontroll av fullständig blodstatus ske.

Patienter med reducerad UGT1A1-aktivitet

Patienter som är långsamma UGT1A1-metabolisera, såsom patienter med Gilberts syndrom (t.ex. homozygota för UGT1A1*28- eller *6-varianter) löper ökad risk för allvarlig neutropeni och diarré efter behandling med irinotekan. Denna risk ökar med dosnivån av irinotekan.

Även om ingen exakt dosreduktion av startdosen har fastställts, bör man beakta att reducera startdosen av irinotekan för patienter som är långsamma UGT1A1-metabolisera, särskilt patienter som administreras doser på > 180 mg/m² eller sköra patienter. Relevanta kliniska riktlinjer bör beaktas för dosrekommendationer i denna patientpopulation. Efterföljande doser kan ökas baserat på den enskilda patientens tolerans mot behandling.

UGT1A1-genotypning kan användas för att identifiera patienter med ökad risk för allvarlig neutropeni och diarré, men den kliniska nyttan av genotypning för behandling är dock oviss, eftersom UGT1A1-polymorfism inte står för all toxicitet som ses på grund av behandling med irinotekan (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Leverfunktionstester bör utföras vid behandlingsstart och före varje cykel.

Kontroll med fullständig blodkroppsräkning varje vecka bör ske hos patienter med ett bilirubinvärde mellan 1,5 och 3 gånger det övre normalvärdet, på grund av minskad clearance av irinotekan (se avsnitt 5.2) och därmed ökad risk för hematotoxicitet i denna patientgrupp. För patienter med ett bilirubinvärde > 3 gånger det övre normalvärdet, se avsnitt 4.3.

Illamående och kräkningar

Profylaktisk behandling med antiemetika rekommenderas före varje behandling med irinotekan. Illamående och kräkningar är vanligt förekommande. Patienter med kräkningar i samband med fördröjd diarré ska läggas in på sjukhus för behandling så fort som möjligt.

Akut kolinergiskt syndrom

Om akut kolinergiskt syndrom uppträder (definierat som tidig diarré och flera andra symptom såsom svettning, bukkramper, mios och salivering) bör atropinsulfat (0,25 mg subkutant) ges om inte kliniska kontraindikationer föreligger (se avsnitt 4.8).

Dessa symptom kan ses under eller strax efter irinotecan-infusion, och tros bero på irinotecans anticholinesteras-aktivitet, och ses mer frekvent vid högre irinotecan-doser.

Försiktighet ska iakttas hos patienter med astma. Hos patienter som drabbats av akut och allvarligt kolinergiskt syndrom rekommenderas profylaktiskt atropinsulfat vid efterföljande doser av irinotekan.

Respiratoriska störningar

Interstitiell lungsjukdom, som yttrar sig som lunginfiltrat, är mindre vanligt under irinotekanbehandling. Interstitiell lungsjukdom kan få dödlig utgång. Riskfaktorer som möjligen kan ha samband med utvecklingen av interstitiell lungsjukdom inkluderar användning av pneumotoxiska läkemedel, strålbehandling och kolonistimulerande faktorer. Patienter med riskfaktorer ska följas noga med avseende på respiratoriska symptom före och under irinotekanbehandling.

Extravasation

Irinotekan är inte känt för att orsaka blåsbildning men försiktighet ska ändå iakttas för att undvika extravasation och infusionsstället ska övervakas för tecken på inflammation. Vid extravasation rekommenderas spolning av infusionsstället och kylningsmedisiner.

Äldre

Eftersom nedsatta biologiska funktioner, särskilt leverfunktion, är vanligare hos äldre patienter bör dosering av irinotekan ske med försiktighet i denna patientgrupp (se avsnitt 4.2).

Patienter med tarmobstruktion

Patienter får inte behandlas med irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd (se avsnitt 4.3).

Njurfunktion

Förhöjningar av serumkreatinin eller blodurea har observerats. Akuta fall av njursvikt har förekommit. Dessa händelser berodde i allmänhet på infektionskomplikationer eller uttorkning i samband med illamående, kräkningar eller diarré. Sällsynta fall av nedsatt njurfunktion på grund av tumörllyssyndrom har också rapporterats.

Strålbehandling

Patienter som tidigare har fått strålbehandling mot bäcken eller buk löper ökad risk för myelosuppression efter administrering av irinotekan. Läkare ska iakta försiktighet vid behandling av patienter med omfattande tidigare strålbehandling (t.ex. strålning mot > 25 % av benmärgen och inom 6 veckor innan behandling med irinotekan påbörjas). Dosjustering kan behövas hos denna population (se avsnitt 4.2).

Hjärtsjukdomar

Myokardischemiska händelser har observerats efter irinotekanbehandling, främst hos patienter med en underliggande hjärtsjukdom, andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom eller tidigare cytotoxisk kemoterapi (se avsnitt 4.8).

Patienter med kända riskfaktorer ska därför övervakas noggrant och åtgärder vidtas för att försöka minimera alla kända riskfaktorer som går att påverka (t.ex. rökning, hypertoni och hyperlipidemi).

Kärlsjukdomar

Irinotekan har i sällsynta fall associerats med tromboemboliska händelser (lungemboli, venös trombos och arteriell tromboemboli) hos patienter med flera riskfaktorer utöver den underliggande neoplasmen.

Övrigt

Samtidig administrering av irinotekan och en stark hämmare (t.ex. ketokonazol) eller inducerare (t.ex. rifampicin, carbamazepin, fenobarbital, fenytoin, apalutamid) av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) kan förändra metabolismen av irinotekan och bör undvikas (se avsnitt 4.5).

I sällsynta fall har njursvikt, hypotoni eller cirkulationssvikt observerats hos patienter som drabbats av dehydrering i samband med diarré och/eller kräkningar eller sepsis.

Preventivmedel för fertila kvinnor/män

På grund av risken för gentoxicitet ska fertila kvinnliga patienter rådas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandlingen och i sex månader efter den sista dosen irinotekan.

På grund av risken för gentoxicitet ska manliga patienter med fertila kvinnliga partner rådas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och i tre månader efter den sista dosen irinotekan (se avsnitt 4.6).

Amning

På grund av risken för biverkningar hos ammade barn ska amning avbrytas under behandling med irinotekan (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Hjälpmännen

Detta läkemedel innehåller sorbitol (se avsnitt 2). Sorbitol är en källa till fruktos. Patienter med hereditär fruktosintolerans ska inte använda detta läkemedel om det inte är absolut nödvändigt.

Spädbarn och små barn (yngre än 2 år) har kanske inte ännu diagnostiseras med hereditär fruktosintolerans (HFI). Läkemedel (som innehåller sorbitol/fruktos) som ges intravenöst kan vara livshotande och är kontraindicerat i denna population om det inte är livsnödvändigt och inga andra alternativ finns.

Detaljerad anamnes med avseende på symptom på hereditär fruktosintolerans (HFI) ska tas upp för varje patient innan detta läkemedel ordinaras.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig användning är kontraindicerad (se avsnitt 4.3)

Johannesört: sänker plasmanivåerna av den aktiva metaboliten av irinotekan, SN-38. I en liten farmakokinetisk studie (n = 5), i vilken irinotekan 350 mg/m² administrerades samtidigt som johannesört (*Hypericum perforatum*) 900 mg, observerades en minskning med 42 % av plasmakoncentrationerna av den aktiva metaboliten av irinotekan, SN-38. Därför bör johannesört inte administreras tillsammans med irinotekan.

Levande försvagade vacciner (till exempel vaccin mot gula febern): risk för generaliserad reaktion mot vacciner, möjlig dödlig. Samtidig användning är kontraindicerat under behandling med irinotekan och i ytterligare 6 månader efter behandlingens slut. Avdödat eller inaktiverat vaccin kan ges, men responsen på dessa vacciner kan bli försvagad.

Samtidig användning rekommenderas inte (se avsnitt 4.4)

Samtidig behandling med irinotekan och inducerare av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) kan ändra irinotekans metabolism och bör undvikas (se avsnitt 4.4.).

Potenta CYP3A4- och/eller UGT1A1-inducerare (t ex rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, eller fenytoin eller apalutamid):

Risk för minskad exponering för irinotekan, SN-38 och SN-38-glukuronid och minskade farmakodynamiska effekter. Flera studier har visat att samtidig administrering av CYP3A4-inducerande antiepileptiska läkemedel leder till minskad exponering för irinotekan, SN-38 och SN-38-glukuronid med reducerade farmakodynamiska effekter som följd. Effekterna av sådana antiepileptiska läkemedel återspeglades av en minskning av AUC för SN-38 och SN-38-glukuronid med 50 % eller mer. Förutom induktion av cytokrom P450 3A4-enzymen kan ökad glukuronidering och gallutsöndring bidra till minskad exponering för irinotekan och dess metaboliter. Dessutom med fenytoin: risk för förvärrade kramper på grund av minskad fenytoinabsorption av cytotoxiska läkemedel.

Potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, proteashämmare, klaritromycin, erytromycin, telitromycin):

En studie har visat att samtidig administrering av ketokonazol resulterade i en minskning av AUC för APC med 87 % och en ökning av AUC för SN-38 med 109 % jämfört med när irinotekan ges ensamt.

UGT1A1-hämmare (t.ex. atazanavir, ketokonazol, regorafenib):

Risk för att öka den systemiska exponeringen för SN-38, irinotekans aktiva metabolit. Läkare bör ta hänsyn till detta om kombinationen är oundviklig.

Andra CYP3A4-hämmare (t.ex. krizotinib, idelalisib):

Risk för att öka irinotekantoxicitet på grund av att krizotinib eller idelalisib sänker metabolismen av irinotekan.

Använd med försiktighet

Vitamin K-antagonister: Ökad risk för blödning och trombotiska händelser vid tumörsjukdomar. Om behandling med vitamin K-antagonister är indicerad, krävs tätare övervakning av INR (International Normalised Ratio).

Samtidig användning som ska föranleda särskilt övervägande

Immunsupprimerande medel (t.ex. ciklosporin, takrolimus): ökad immunsuppression med risk för lymfoproliferation.

Neuromuskulärt blockerande medel: Interaktion mellan irinotekan och neuromuskulärt blockerande medel kan inte uteslutas. Eftersom irinotekan har antikolinesterasaktivitet kan de neuromuskulära blockerande effekterna av suxameton förlängas och den neuromuskulära blockaden av icke-depolariseraende läkemedel motverkas.

Andra kombinationer

5-fluorouracil/folinsyra: Samtidig administrering av 5-fluorouracil/folinsyra i kombinationsterapi förändrar inte farmakokinetiken för irinotekan.

Bevacizumab: Resultat från en läkemedelsinteraktionsstudie visade inte någon signifikant effekt av bevacizumab på farmakokinetiken för irinotekan eller dess aktiva metabolit SN-38. Detta utesluter dock inte ökad toxicitet orsakad av deras farmakologiska egenskaper.

Cetuximab: Det finns inga belägg för att säkerhetsprofilen för irinotekan påverkas av cetuximab eller vice versa.

Antineoplastiska läkemedel (flucytosin som en prodrug till 5-fluorouracil):

Biverkningar av irinotekan, till exempel myelosuppression, kan förvärras av andra antineoplastiska läkemedel som har en liknande biverkningsprofil.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Preventivmedel

På grund av risken för gentoxicitet ska fertila kvinnliga patienter rådas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandlingen och i sex månader efter den sista dosen irinotekan (se avsnitt 4.4).

På grund av risken för gentoxicitet ska manliga patienter med fertila kvinnliga partner rådas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och i tre månader efter den sista dosen irinotekan (se avsnitt 4.4).

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av irinotekan i gravida kvinnor. Djurstudier har visat embryotoxiska och teratogena effekter av irinotekan (se avsnitt 5.3). Baserat på resultat från djurstudier och irinotekans verkningsmekanism ska irinotekan därför användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Fertila kvinnor ska inte inleda behandling med irinotekan förrän graviditet har uteslutits. Graviditet ska undvikas om endera partner får irinotekan.

Amning

Tillgängliga data är begränsade, men tyder på att irinotekan och dess metabolit utsöndras i bröstmjölk. På grund av risken för biverkningar hos diande spädbarn, måste amning avbrytas under den tid behandling med irinotekan pågår (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Fertilitet

Data saknas om irinotekans effekt på fertiliteten hos människa. Hos djur har irinotekan visats ha negativa effekter på avkommans fertilitet (se avsnitt 5.3). **Överväg rådgivning om bevarande av ägg/spermier innan behandling med Irinotecan medac inleds.**

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Irinotekan har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter bör varnas för att yrsel eller synrubbningar kan inträffa inom 24 timmar efter administrering av irinotekan och rådas att inte köra bil och inte använda maskiner om dessa symtom uppträder.

4.8 Biverkningar

KLINISKA STUDIER

Utförlig information om biverkningar har samlats in från studier av metastaserande kolorektal cancer och frekvenserna presenteras nedan. Biverkningarna för andra indikationer förväntas likna de för kolorektal cancer.

De vanligaste ($\geq 1/10$), dosbegränsande biverkningarna av irinotekan är fördöjd diarré (som inträffar mer än 24 timmar efter administrering) och blodrubbningar omfattande neutropeni, anemi och trombocytopeni.

Neutropeni är en dosbegränsande toxisk effekt. Neutropeni var reversibel och inte kumulativ. Mediantiden till lägsta nivå var 8 dagar oberoende av om monoterapi eller kombinationsterapi användes.

Övergående, allvarligt, akut kolinergiskt syndrom observerades mycket ofta.

De vanligaste symptomen definierades som tidig diarré och andra symptom, såsom buksmärta, svettning, myos och ökad salivbildning som uppträddes under eller inom 24 timmar efter infusion med irinotekan. Dessa symptom försvann efter administrering av atropin (se avsnitt 4.4).

MONOTERAPI

Följande biverkningar, som bedömts ha möjligt eller troligt samband med administrering av irinotekan, har rapporterats från 765 patienter som fått den rekommenderade dosen 350 mg/m^2 som monoterapi.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga ($\geq 1/10$), vanliga ($\geq 1/100, < 1/10$), mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000, < 1/100$), sällsynta ($\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$), mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$).

Biverkningar rapporterade med irinotekan som monoterapi (350 mg/m^2 var tredje vecka)		
Organsystem	Frekvenskategor	Biverkning
Infektioner och infestationer	Vanliga	Infektion
Blodet och lymfssystemet	Mycket vanliga	Neutropeni
	Mycket vanliga	Anemi
	Vanliga	Trombocytopeni
	Vanliga	Febril neutropeni
Metabolism och nutrition	Mycket vanliga	Nedsatt aptit
Centrala och perifera nervsystemet	Mycket vanliga	Kolinergiskt syndrom
Magtarmkanalen	Mycket vanliga	Diarré
	Mycket vanliga	Kräkning
	Mycket vanliga	Illamående
	Mycket vanliga	Buksmärta
	Vanliga	Förstoppning
Sjukdomar i hud och subkutan vävnad	Mycket vanliga	Alopeci (reversibel)
Allmänna sjukdomar och tillstånd på administreringsställe	Mycket vanliga	Slemhinneinflammation
	Mycket vanliga	Pyrexia
	Mycket vanliga	Asteni
Utredningar	Vanliga	Förhöjd kreatinininnivå i blodet
	Vanliga	Förhöjda transaminasnivåer (ALT och AST)
	Vanliga	Förhöjd bilirubinnivå i blodet
	Vanliga	Förhöjd nivå av alkaliskt fosfat i blodet

Beskrivning av valda biverkningar (monoterapi)

Svår diarré observerades hos 20 % av patienterna som följe rekommendationerna för hantering av diarré. Av de cykler som kunde utvärderas hade 14 % svår diarré. Mediantiden till första vattniga avföring var dag 5 efter irinotekaninfusionen.

Illamående och kräkningar var svåra hos cirka 10 % av patienterna som behandlades med antiemetika.

Förstoppning har observerats hos mindre än 10 % av patienterna.

Neutropeni observerades hos 78,7 % av patienterna och var svår (neutrofiler < 500 celler/mm³) hos 22,6 % av patienterna. Av de cykler som kunde utvärderas hade 18 % ett neutrofiltal på under 1 000 celler/mm³, inklusive 7,6 % med ett neutrofiltal på < 500 celler/mm³.

Total återhämtning hade vanligtvis uppnåtts dag 22.

Febril neutropeni rapporterades hos 6,2 % av patienterna och under 1,7 % av cyklerna.

Infektioner uppstod hos cirka 10,3 % av patienterna (2,5 % av cyklerna) och associerades med svår neutropeni hos cirka 5,3 % av patienterna (1,1 % av cyklerna), och ledde till dödsfall i 2 fall.

Anemi rapporterades hos cirka 58,7 % av patienterna (8 % med hemoglobin < 8 g/dl och 0,9 % med hemoglobin < 6,5 g/dl).

Trombocytopeni (< 100 000 celler/mm³) observerades hos 7,4 % av patienterna och 1,8 % av cyklerna med 0,9 % med trombocytantal ≤ 50 000 celler/mm³ och 0,2 % av cyklerna.

Nästan alla patienter hade återhämtat sig dag 22.

Akut kolinergiskt syndrom

Allvarligt, övergående, akut kolinergiskt syndrom observerades hos 9 % av patienterna som behandlades med monoterapi.

Asteni var svår hos mindre än 10 % av patienterna som behandlades med monoterapi. Orsakssambandet med irinotekan har inte fastställts.

Pyrexia utan förekomst av infektion och utan samtidig svår neutropeni uppstod hos 12 % av patienterna som behandlades med monoterapi.

Laboratorietester

Övergående och milda till måttliga ökningar av antingen transaminaser, alkaliskt fosfatas eller bilirubin i serum observerades hos 9,2 %, 8,1 % respektive 1,8 % av patienterna, utan förekomst av progressiv levermetastas.

Övergående och milda till måttliga ökningar av kreatinin i serum har observerats hos 7,3 % av patienterna.

KOMBINATIONSBEHANDLING

De biverkningar som beskrivs i detta avsnitt gäller för irinotekan.

Det finns inga belägg för att säkerhetsprofilen för irinotekan påverkas av cetuximab eller vice versa. De rapporterade biverkningarna som tillkom vid kombinationsterapi med cetuximab var de som förväntades med cetuximab (såsom akneliknande utslag, 88 %). Se också respektive produktresumé för information om biverkningar av irinotekan i kombination med cetuximab.

Läkemedelsbiverkningar rapporterade hos patienter som behandlats med kapecitabin i kombination med irinotekan, utöver de som har observerats vid monoterapi med kapecitabin eller som har observerats med högre frekvens jämfört med kapecitabin som monoterapi, inkluderar: *mycket vanliga, samtliga biverkningsgrader: trombos/emboli; vanliga, samtliga biverkningsgrader: överkänslighet, hjärtischemi-/infarkt; vanliga, biverkningsgrad 3 och 4: febril neutropeni.* För fullständig information om biverkningar av kapecitabin hänvisas till produktresumén för kapecitabin.

Biverkningar av grad 3 och 4 rapporterade hos patienter behandlade med kapecitabin i kombination med irinotekan och bevacizumab, utöver de som observerats vid monoterapi med kapecitabin eller som har observerats med högre frekvens jämfört med kapecitabin som monoterapi, inkluderar: *vanliga, biverkningsgrad 3 och 4: neutropeni, trombos/emboli, hypertoni och hjärtischemi-/infarkt.* För fullständig information om biverkningar av kapecitabin och bevacizumab hänvisas till respektive produktresumé.

Hypertoni av grad 3 var den huvudsakliga risken vid tillägg av bevacizumab till bolusdosen av irinotekan/5-FU/folinsyra. Med denna behandlingsregim sågs även en liten ökning av kemoterapibiverkningarna diarré och leukopeni av grad 3/4 jämfört med de patienter som fick bolusdos av

endast irinotekan/5-FU/folinsyra. För mer information om biverkningar vid kombination med bevacizumab hänvisas till produktresumén för bevacizumab.

Irinotekan har studerats i kombination med 5-FU och folinsyra för metastaserande kolorektal cancer.

Säkerhetsdata gällande biverkningar från kliniska studier upptalar mycket vanligt förekommande, möjligtvis eller troligtvis relaterade, biverkningar av NCI-grad 3 eller 4 i organensystemen blodet och lymfssystemet, magtarmkanalen samt hud och subkutan vävnad.

Följande biverkningar anses vara möjligtvis eller troligtvis relaterade till administrering av irinotekan och har rapporterats av 145 patienter som behandlats med irinotekan i kombination med 5FU/folinsyra varannan vecka i den rekommenderade dosen 180 mg/m².

Biverkningar rapporterade med irinotekan i kombinationsbehandling (180 mg/m² varannan vecka)		
Organsystem	Frekvenskategori	Biverkning
Infektioner och infestationer	Vanliga	Infektion
Blodet och lymfssystemet	Mycket vanliga	Trombocytopeni
	Mycket vanliga	Neutropeni
	Mycket vanliga	Anemi
	Vanliga	Febril neutropeni
Metabolism och nutrition	Mycket vanliga	Nedsatt aptit
Centrala och perifera nervsystemet	Mycket vanliga	Kolinergiskt syndrom
Magtarmkanalen	Mycket vanliga	Diarré
	Mycket vanliga	Kräkningar
	Mycket vanliga	Illamående
	Vanliga	Buksmärta
	Vanliga	Förstopning
Sjukdomar i hud och subkutan vävnad	Mycket vanliga	Alopeci (reversibel)
Allmänna sjukdomar och tillstånd på administreringsställe	Mycket vanliga	Slemhinneinflammation
	Mycket vanliga	Asteni
	Vanliga	Pyrexia
Utredningar	Mycket vanliga	Förhöjda transaminasnivåer (ALT och AST)
	Mycket vanliga	Förhöjd bilirubinnivå i blodet
	Mycket vanliga	Förhöjd nivå av alkaliskt fosfat i blodet

Beskrivning av valda biverkningar (kombinationsbehandling)

Svår diarré observerades hos 13,1 % av patienterna som följde rekommendationerna för hantering av diarré. Av de cykler som kunde utvärderas hade 3,9 % svår diarré.

Lägre förekomst av svårt **illamående** och svåra **kräkningar** observerades (2,1 % respektive 2,8 % av patienterna).

Förstopning relaterad till irinotekan och/eller loperamid har observerats hos 3,4 % av patienterna.

Neutropeni observerades hos 82,5 % av patienterna och var svår (neutrofital < 500 celler/mm³) hos 9,8 % av patienterna. Av de cykler som kunde utvärderas hade 67,3 % ett neutrofital på under 1 000 celler/mm³, inklusive 2,7 % med ett neutrofital på < 500 celler/mm³. Total återhämtning nåddes vanligtvis inom 7-8 dagar.

Febril neutropeni rapporterades hos 3,4 % av patienterna och i 0,9 % av cyklerna.

Infektioner förekom hos cirka 2 % av patienterna (0,5 % av cyklerna) och associerades med svår neutropeni hos cirka 2,1 % av patienterna (0,5 % av cyklerna), och ledde till dödsfall i 1 fall.

Anemi rapporterades hos 97,2 % av patienterna (2,1 % med hemoglobin < 8 g/dl).

Trombocytopeni (< 100 000 celler/mm³) observerades hos 32,6 % av patienterna och 21,8 % av cyklerna.

Ingen svår trombocytopeni (< 50 000 celler/mm³) har observerats.

Akut kolinergiskt syndrom Allvarligt, övergående, akut kolinergiskt syndrom observerades hos 1,4 % av patienterna som fick kombinationsbehandling.

Asteni var svår hos 6,2 % av patienterna som fick kombinationsbehandling. Orsakssambandet med irinotekan har inte fastställts.

Pyrexia utan förekomst av infektion och utan samtidig svår neutropeni förekom hos 6,2 % av patienterna som fick kombinationsbehandling.

Laboratoriester Övergående serumnivåer (grad 1 och 2) av antingen ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas eller bilirubin observerades hos 15 %, 11 %, 11 % respektive 10 % av patienterna, utan progredierande levermetastaser. Övergående grad 3 observerades hos 0 %, 0 %, 0 % respektive 1 % av patienterna. Inga grad 4 observerades.

Mycket sällsynta fall av ökad nivå av amylas och/eller lipas har rapporterats.

Sällsynta fall av hypokalemia och hyponatremi, till största delen relaterade till diarré och kräkningar, har rapporterats.

ÖVRIGA BIVERKNINGAR SOM RAPPORTERATS I KLINISKA STUDIER MED VECKOVIS BEHANDLINGSREGIM MED IRINOTEKAN

Följande ytterligare läkemedelsrelaterade händelser har rapporterats i kliniska studier med irinotekan: smärta, sepsis, anorektal sjukdom, kandidainfektion i magtarmkanalen, hypomagnesemi, utslag, tecken i hud, gånggrubbing, förvirring, huvudvärk, syncope, hudrodnad, bradykardi, urinvägsinfektion, smärta i brösten, ökat gammaglutamyltransferas, extravasation och tumörlyssyndrom, hjärt-kärlsjukdomar (angina pectoris, hjärtstillestånd, hjärtinfarkt, hjärtischemi, perifer kärlsjukdom, kärlsjukdom), och tromboemboliska händelser (arteriell trombos, hjärninfarkt, stroke, djup ventrombos, perifer embolism, lungembolism, tromboflebit, trombos, och plötslig död) (se avsnitt 4.4).

ÖVERVAKNING EFTER GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Biverkningsfrekvenser från övervakning efter godkännande för försäljning är okända (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem	Biverkning
Infektioner och infestationer	<ul style="list-style-type: none">Pseudomembranös kolit, varav ett fall har dokumenterats bakteriologiskt (<i>Clostridium difficile</i>)SepsisSvampinfektioner *Virusinfektioner †
Blodet och lymfssystemet	<ul style="list-style-type: none">Trombocytopeni med antikroppar mot trombocyter
Immunsystemsjukdomar	<ul style="list-style-type: none">ÖverkänslighetAnafylaktisk reaktion
Metabolism och nutrition	<ul style="list-style-type: none">Dehydrering (p.g.a. diarré och kräkningar)Hypovolemi

Centrala och perifera nervsystemet	<ul style="list-style-type: none"> Talstörningar, generellt övergående. I vissa fall hänfördes fallet till det kolinergiska syndrom som observerades under eller strax efter infusion av irinotekan Parestesi Ofrivilliga muskelkontraktioner
Hjärtsjukdomar	<ul style="list-style-type: none"> Hypertoni (under eller efter infusion) Kardiogen chock[‡]
Vaskulära sjukdomar	<ul style="list-style-type: none"> Hypotonii[‡]
Respiratoriska, torakala och mediastinala sjukdomar	<ul style="list-style-type: none"> Interstitiell lungsjukdom som visar sig som lunginfiltration är ovanligt under irinotekanbehandling; tidiga effekter som dyspné har rapporterats (se avsnitt 4.4). Dyspné (se avsnitt 4.4) Hicka

Magtarmkanalen	<ul style="list-style-type: none"> • Tarmobstruktion • Ileus: fall av ileus utan föregående kolit har också rapporterats • Megakolon • Gastrointestinal blödning • Kolit; i vissa fall komplicerades kolit av sår bildning, blödning, ileus eller infektion. • Tyflit • Ischemisk kolit • Ulcerös kolit • Ökade pankreasenzym, med eller utan symptom • Perforation av tarm
Lever och gallvägar	<ul style="list-style-type: none"> • Steatohepatit • Hepatisk steatos
Sjukdomar i hud och subkutan vävnad	<ul style="list-style-type: none"> • Hudreaktioner
Muskuloskeletala systemet och bindväv	<ul style="list-style-type: none"> • Kramper

Njur- och urinvägssjukdomar	<ul style="list-style-type: none"> • Nedslatt njurfunktion och akut njursvikt, generellt hos patienter som drabbas av infektion och/eller volymminskning p.g.a. svåra gastrointestinala toxiciteter[‡] • Njursvikt[†]
Allmänna sjukdomar och tillstånd på administreringsställe	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktioner på infusionsstället
Utredningar	<ul style="list-style-type: none"> • Ökat amylas • Ökat lipas • Hypokalemi • Hyponatremi, oftast relaterad till diarré och kräkningar • Ökade transaminaser (dvs. ASAT och ALAT) i frånvaro av progredierande levermetastaser har rapporterats i mycket sällsynta fall.

*t.ex. pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii, lungaspergillos, systemisk kandida.

[†]t.ex. Herpes zoster, influensa, återaktivering av hepatitis B, kolit orsakad av cytomegalovirus.

[‡]Enstaka fall av njursvikt, hypotonii eller kardiologisk chock har observerats hos patienter som drabbats av dehydrering i samband med diarré och/eller kräkningar, eller sepsis.

Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nyttar-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PL 55

00034 Fimea

4.9 Överdosering

Symtom

Det har förekommit rapporter på överdosering med doser upp till ungefär två gånger den rekommenderade terapeutiska dosen, vilket kan få dödlig utgång. De viktigaste biverkningarna som rapporterades var svår neutropeni och svår diarré.

Behandling

Det finns ingen känd antidot mot irinotekan. Maximalt stödjande behandling bör sättas in för att förebygga dehydrering på grund av diarré och för att behandla infektiösa komplikationer.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, topoisomeras 1 (TOP1) –hämmare, ATC-kod: L01CE02

Verkningsmekanism

Irinotekan är ett semisyntetiskt derivat av kamptotecin. Det är ett antineoplastiskt medel som verkar som en specifik hämmare av DNA-topoisomeras I. Det metaboliseras i de flesta vävnader av karboxylesteras till metaboliten SN-38, som har visat sig vara mer aktiv än irinotekan i renat topoisomeras I och mer cytotoxiskt än irinotekan mot flera murina och humana tumörcelllinjer. Hämningen av DNA-topoisomeras I med irinotekan eller SN-38 omfattar enkelsträngsbrott på DNA, vilket blockerar DNA-replikationsgaffeln och är orsak till cytotoxiciteten. Denna cytotoxiska aktivitet har visat sig vara tidsberoende och specifik för S-fasen.

In vitro påverkas inte irinotekan och SN-38 signifikant av P-glykoprotein MDR, och de visar cytotoxisk aktivitet mot doxorubicin- och vinblastinresistenta celllinjer.

Dessutom har irinotekan en bred tumörhämmande effekt *in vivo* i murina tumörmodeller (duktalt P03-adenokarcinom i pankreas, MA16/C-mammar-adenokarcinom, C38- och C51-kolon-adenokarcinom) och på humana xenografer (Co-4 kolon-adenokarcinom, Mx-1 mammar-adenokarcinom, ST-15 och SC-16 ventrikels-adenokarcinom). Irinotekan är också aktivt mot tumörer som uttrycker P-glykoprotein MDR (vinkristin- och doxorubicinresistenta P388-leukemier).

Farmakodynamisk effect

Utöver den tumörhämmande aktiviteten, är den mest relevanta farmakologiska effekten hämning av acetylkolinesteras.

Klinisk effekt och säkerhet

Vid kombinationsterapi som första linjens behandling av metastatisk kolorektalcancer

Vid kombinationsterapi med folinsyra och 5-fluorouracil

En fas III-studie genomfördes på 385 tidigare obehandlade patienter med metastatisk kolorektal cancer som behandlades antingen med dosering varannan vecka (se avsnitt 4.2) eller dosering varje vecka. Vid dosering varannan vecka gavs irinotekan dag 1 i dosen 180 mg/m² en gång varannan vecka följt av infusion med folinsyra (200 mg/m² som intravenös infusion under 2 timmar) och 5-fluorouracil (400 mg/m² som en intravenös bolusinjektion, följt av 600 mg/m² som intravenös infusion under 22 timmar). Dag 2 gavs folinsyra och 5-fluorouracil i samma doser och enligt samma schema. Vid behandling varje vecka gavs irinotekan i dosen 80 mg/m² följt av infusion med folinsyra (500 mg/m² som intravenös infusion under två timmar) och därefter 5-FU (2 300 mg/m² som intravenös infusion under 24 timmar) i sex veckor.

I prövningen på kombinationsterapi med de 2 ovan beskrivna regimerna utvärderades effekten av irinotekan hos 198 behandlade patienter:

	Kombinerade regimer (n=198)		Behandling varje vecka (n=50)		Behandling varannan vecka (n=148)	
	Irinotekan + 5-FU/folinsyra)	5-FU/folinsyra	Irinotekan + 5-FU/folinsyra)	5-FU/folinsyra	Irinotekan + 5-FU/folinsyra)	5-FU/folinsyra
Responsfrekvens (%)	40,8*	23,1*	51,2*	28,6*	37,5*	21,6*
p-värde	< 0,001		0,045		0,005	
Mediantid till progression (månader)	6,7	4,4	7,2	6,5	6,5	3,7
p-värde	< 0,001		NS		0,001	
Medianduration av respons (månader)	9,3	8,8	8,9	6,7	9,3	9,5
p-värde	NS		0,043		NS	
Medianduration av respons och stabilisering (månader)	8,6	6,2	8,3	6,7	8,5	5,6
p-värde	< 0,001		NS		0,003	
Mediantid till behandlingssvikt (månader)	5,3	3,8	5,4	5,0	5,1	3,0
p-värde	0,0014		NS		< 0,001	
Medianöverlevnad (månader)	16,8	14,0	19,2	14,1	15,6	13,0
p-värde	0,028		NS		0,041	

* enligt per protokollpopulationsanalys; 5-FU = 5-fluorouracil; NS = ej signifikant

Vid behandling varje vecka var incidensen av svår diarré 44,4 % hos patienter som behandlats med irinotekan i kombination med 5-FU/folinsyra och 25,6 % hos patienter som behandlats med 5-FU/folinsyra ensamt. Incidensen av svår neutropeni (neutrofilantal < 500 celler/mm³) var 5,8 % hos patienter som behandlats med irinotekan i kombination med 5-FU/folinsyra och 2,4 % hos patienter som behandlats med 5-FU/folinsyra ensamt.

Dessutom var mediantiden till definitivt försämrat allmäntillstånd signifikant längre i gruppen som fått kombinationsbehandling med irinotekan än i gruppen som fått 5-FU/folinsyra ensamt ($p = 0,046$).

Livskvalitet utvärderades i denna fas III-studie med hjälp av formuläret EORTC QLQ-C30. Tiden till definitiv försämring var konsekvent längre i de grupper som behandlats med irinotekan. Utvecklingen av globalt hälsotillstånd/livskvalitet var något bättre i gruppen som fått kombinationsbehandling med irinotekan, även om den inte var signifikant, vilket visade att effekt av kombinationsbehandling med irinotekan kunde uppnås utan att påverka livskvaliteten.

I kombinationsbehandling med bevacizumab

En randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad klinisk fas III-prövning utvärderade bevacizumab i kombination med irinotekan/5-FU/folinsyra som förstahandsbehandling vid metastatiskt karcinom i kolon eller rektum (Studie AVF2107g). Tillägg av bevacizumab till kombinationen irinotekan/5-FU/folinsyra resulterade i en statistiskt signifikant ökning av den totala överlevnaden. Den kliniska fördelen, mätt som

total överlevnad, observerades i alla fördefinierade undergrupper av patienter, inklusive de som definierats med avseende på ålder, kön, allmäntillstånd, lokalisering av primärtumör, antal involverade organ och durationen av den metastatiska sjukdomen. Se även produktresumén för bevacizumab.

Effektdata från Studie AVF2107g sammanfattas i tabellen nedan.

	AVF2107g	
	Arm 1 Irinotekan/5-FU/folinsyra + placebo	Arm 2 Irinotekan/5-FU/folinsyra + bevacizumab ^a
Antal patienter	411	402
Total överlevnad		
Mediantid (månader)	15,6	20,3
95 % konfidensintervall	14,29–16,99	18,46 – 24,18
Riskkvot ^b		0,660
p-värde		0,00004
Progressionsfri överlevnad		
Mediantid (månader)	6,2	10,6
Riskkvot ^b		0,54
p-värde		<0,0001
Total responsfrekvens		
Frekvens (%)	34,8	44,8
95 % konfidensintervall	30,2 – 39,6	39,9 – 49,8
p-värde		0,0036
Responsduration		
Mediantid (månader)	7,1	10,4
25–75 percentil (månader)	4,7 – 11,8	6,7 – 15,0

^a 5 mg/kg varannan vecka; ^b Relativt kontrollarmen.

Vid kombinationsterapi med cetuximab

EMR 62 202-013: Denna randomiserade studie på patienter med metastatisk kolorektalcancer som tidigare inte hade fått någon behandling för sin metastaserade sjukdom jämförde kombinationen av cetuximab och irinotekan plus infusion av 5-fluorouracil/folinsyra (5-FU/FA) (599 patienter) med patienter som fick samma kemoterapi enbart (599 patienter). Andelen patienter med KRAS vildtyp-tumörer från patientpopulationen med utvärderingsbar KRAS-status var 64 %.

Effektdata för denna studie sammanfattas i tabellen nedan:

Variabel/statistik	Hela populationen		KRAS vildtyp-population	
	Cetuximab plus FOLFIRI (N = 599)	FOLFIRI (N = 599)	Cetuximab plus FOLFIRI (N = 172)	FOLFIRI (N = 176)
ORR				
% (95 % KI)	46,9 (42,9, 51,0)	38,7 (34,8, 42,8)	59,3 (51,6, 66,7)	43,2 (35,8, 50,9)
p-värde		0,0038		0,0025
PFS				
Riskkvot (95 % KI)	0,85 (0,726, 0,998)		0,68 (0,501, 0,934)	
p-värde	0,0479		0,0167	

KI = konfidensintervall, FOLFIRI = irinotekan plus infusion av 5-FU/FA, ORR = objektiv responsfrekvens (patienter med fullständig eller partiell respons), PFS = progressionsfri överlevnadstid

Vid kombinationsterapi med kapecitabin

Data från en randomiserad, kontrollerad fas III-studie (CAIRO) stödjer användning av kapecitabin med en startdos på 1 000 mg/m² under 2 veckor var tredje vecka i kombination med irinotekan som första linjens behandling för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Åttahundratjugo (820) patienter randomiseras till antingen sekventiell behandling (n = 410) eller kombinationsterapi (n = 410). Den sekventiella behandlingen bestod av första linjens behandling med kapecitabin (1 250 mg/m² 2 gånger dagligen under 14 dagar), andra linjens behandling med irinotekan (350 mg/m² dag 1) och tredje linjens behandling med en kombination av kapecitabin (1 000 mg/m² 2 gånger dagligen under 14 dagar) plus oxaliplatin (130 mg/m² dag 1). Kombinationsterapin bestod av första linjens behandling med kapecitabin (1 000 mg/m² 2 gånger dagligen under 14 dagar) i kombination med irinotekan (250 mg/m² dag 1) (XELIRI) och andra linjens behandling med kapecitabin (1 000 mg/m² 2 gånger dagligen under 14 dagar) plus oxaliplatin (130 mg/m² dag 1). Alla behandlingscykler administreras i intervall om 3 veckor. För första linjens behandling var medianen för progressionsfri överlevnad i intent-to-treat-populationen 5,8 månader (95 % KI, 5,1-6,2 månader) för monoterapi med kapecitabin och 7,8 månader (95 % KI, 7,0-8,3 månader) för XELIRI (p = 0,0002).

Data från en interimsanalys av en randomiserad, kontrollerad, multicenterstudie i fas II (AIO KRK 0604) stödjer användningen av kapecitabin med en startdos på 800 mg/m² under 2 veckor var tredje vecka i kombination med irinotekan och bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer.

Ethundrafemton (115) patienter randomiseras till behandling med kapecitabin i kombination med irinotekan (XELIRI) och bevacizumab: kapecitabin (800 mg/m² 2 gånger dagligen under 2 veckor följt av en vilofas på 7 dagar), irinotekan (200 mg/m² som en infusion under 30 minuter dag 1 var tredje vecka) och bevacizumab (7,5 mg/kg som en infusion under 30-90 minuters dag 1 var tredje vecka). Totalt randomiseras 118 patienter till behandling med kapecitabin i kombination med oxaliplatin plus bevacizumab: kapecitabin (1 000 mg/m² 2 gånger dagligen under 2 veckor följt av en viloperiod på 7 dagar), oxaliplatin (130 mg/m² som en infusion under 2 timmar dag 1 var tredje vecka) och bevacizumab (7,5 mg/kg som en infusion under 30-90 minuters på dag 1 var tredje vecka). Progressionsfri överlevnad vid 6 månader i intent-to-treat-populationen var 80 % (XELIRI plus bevacizumab) jämfört med 74 % (XELOX plus bevacizumab). Den sammantagna responsfrekvensen (fullständig respons plus partiell respons) var 45 % (XELOX plus bevacizumab) jämfört med 47 % (XELIRI plus bevacizumab).

Vid monoterapi som andra linjens behandling av metastatisk kolorektalcancer

Kliniska fas II/III-studier genomfördes med behandling var 3:e vecka av mer än 980 patienter med metastatisk kolorektal cancer som sviktat på tidigare behandling med 5-FU. Effekten av irinotekan utvärderades hos 765 patienter med dokumenterad progression under behandling med 5-FU när de började i studien.

Fas III-prövningar	Irinotekan mot bästa stödjande vård			Irinotekan mot 5-FU		
	Irinotekan n = 183	Bästa stödjande vård n = 90	p-värde	Irinotekan n = 127	5-FU n = 129	p-värde
Progressionsfri överlevnad vid 6 månader (%)	NA	NA		33,5*	26,7	0,03
Överlevnad vid 12 månader (%)	36,2*	13,8	0,0001	44,8*	32,4	0,0351
Medianöverlevnad (månader)	9,2*	6,5	0,0001	10,8*	8,5	0,0351

*statistiskt signifikant skillnad; NA = ej relevant

I fas II-studier, genomförda på 455 patienter som behandlades var 3:e vecka, var den progressionsfria överlevnaden vid 6 månader 30 % och medianöverlevnaden var 9 månader. Mediantiden till progression var 18 veckor.

Dessutom har icke jämförande fas II-studier genomförts på 304 patienter med behandling varje vecka med dosen 125 mg/m² administrerad som en intravenös infusion under 90 minuter i 4 på varandra följande veckor följd av en tvåveckors viloperiod. I dessa studier var mediantiden till progression 17 veckor och medianöverlevnaden var 10 månader.

En liknande biverkningsprofil har observerats vid behandling varje vecka av 193 patienter med startdosen 125 mg/m², jämfört med en dos var 3:e vecka. Mediantiden till den första flytande avföringen var 11 dagar.

I kombination med cetuximab efter behandlingssvikt på irinotekan inklusive cytotoxisk behandling

Effekten av kombinationen av cetuximab och irinotekan undersöktes i två kliniska studier. Totalt 356 patienter med metastatisk kolorektal cancer som uttryckte EGFR, vilka nyligen hade sviktat på irinotekaninnehållande cytotoxisk behandling, fick kombinationsbehandling. Patienterna hade ett värde på minst 60 % enligt Karnofskys skattningsskala för hälsotillstånd, men majoriteten hade ett värde på ≥ 80 % enligt Karnofskys skattningsskala.

EMR 62 202-007: Denna randomiserade studie jämförde kombinationen cetuximab och irinotekan (218 patienter) med cetuximab som monoterapi (111 patienter).

IMCL CP02-9923: Denna öppna studie med en enkel behandlingsarm undersökte kombinationsterapi hos 138 patienter.

Effektdata från dessa studier sammanfattas i tabellen nedan:

Studie	n	ORR		DCR		PFS (månader)		OS (månader)	
		n (%)	95 % KI	n (%)	95 % KI	Median	95 % KI	Median	95 % KI
Cetuximab + irinotekan									
EMR 62 202-007	218	50 (22,9)	17,5, 29,1	121 (55,5)	48,6, 62,2	4,1	2,8, 4,3	8,6	7,6, 9,6
IMCL CP02-9923	138	21 (15,2)	9,7, 22,3	84 (60,9)	52,2, 69,1	2,9	2,6, 4,1	8,4	7,2, 10,3
Cetuximab									
EMR 62 202-007	111	12 (10,8)	5,7, 18,1	36 (32,4)	23,9, 42,0	1,5	1,4, 2,0	6,9	5,6, 9,1
KI = konfidensintervall; DCR = sjukdomskontroll (patienter med kompletta respons, partiella respons eller stabil sjukdom i minst 6 veckor); ORR = objektiv responsfrekvens (patienter med kompletta respons eller partiella respons); OS = total överlevnadstid; PFS = progressionsfri överlevnad									

Effekten av kombinationen cetuximab och irinotekan var bättre än effekten av cetuximab som monoterapi när det gällde objektiv respons (ORR), sjukdomskontroll (DCR) och progressionsfri överlevnad (PFS). I den randomiserade prövningen visades inga effekter på total överlevnad (riskkvot 0,91; p = 0,48).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

I slutet av infusionen, med den rekommenderade dosen 350 mg/m², var de högsta genomsnittliga koncentrationerna av irinotekan och SN-38 i plasma 7,7 µg/ml respektive 56 ng/ml, och det genomsnittliga värdet för ytan under kurvan (AUC) var 34 µg·timme/ml respektive 451 ng·timme/ml. En stor variation mellan individer i farmakokinetiska parametrar observeras vanligtvis för SN-38.

Distribution

I fas I-studien med 60 patienter som fick behandlingsregimen 30 minuters intravenös infusion av 100-750 mg/m² var 3:e vecka var distributionsvolymen vid steady state (V_{ss}) 157 l/m².

In vitro var plasmaproteinbindningen för irinotekan och SN-38 ungefär 65 % respektive 95 %.

Metabolism

Massbalans- och metabolismstudier med ¹⁴C-märkt läkemedel har visat att mer än 50 % av en intravenöst administrerad dos av irinotekan utsöndras som oförändrat läkemedel, varav 33 % i feces, främst via gallan, och 22 % i urinen.

Två metaboliska vägar står för vardera minst 12 % av dosen:

- Hydrolys med karboxylesteras till den aktiva metaboliten SN-38, som främst elimineras genom glukuronidering och vidare genom biliär och renal utsöndring (mindre än 0,5 % av irinotekandosen). SN-38-glukuronid hydrolyseras troligen därefter i tarmen.
- Cytokrom P450 3A-enzymberoende oxidationer resulterar i öppnandet av den yttre piperidinringen vid bildning av APC (aminopentansyraderivat) och NPC (primära aminderivat) (se avsnitt 4.5).

I plasma förekommer främst oförändrat irinotekan, följt av APC, SN-38-glukuronid och SN-38. Endast SN-38 har signifikant cytotoxisk aktivitet.

Eliminering

I en fas I-studie på 60 patienter där dosen 100 – 750 mg/m² gavs som intravenös infusion var 3:e vecka, visade irinotekan en bifasisk eller trifasisk elimineringsprofil. Genomsnittlig plasmaclearance var 15 liter/timme/m². Genomsnittlig halveringstid i plasma var 12 minuter för den första fasen av den trifasiska modellen, 2,5 timmar för den andra fasen och 14,2 timmar för den terminala fasen. SN-38 visade en bifasisk elimineringsprofil med en genomsnittlig terminal halveringstid på 13,8 timmar.

Clearance av irinotekan sjunker med omkring 40 % hos patienter med bilirubinemi med bilirubinvärden mellan 1,5 och 3 gånger det övre normalvärdet. Hos dessa patienter leder en irinotekandos på 200 mg/m² till en läkemedelsexponering i plasma, vilken är jämförbar med vad som observeras med 350 mg/m² hos cancerpatienter med normala levervärden.

Linjäritet/icke-linjäritet

En populationsfarmakokinetisk analys av irinotekan har genomförts på 148 patienter med metastatisk kolorektal cancer, behandlade med olika scheman och olika doser i fas II-prövningar. Farmakokinetiska parametrar uppskattade med en trekompartimentmodell liknade dem som observerades i fas I-studier. Alla studier har visat att exponeringen för irinotekan och SN-38 ökar proportionellt med den administrerade dosen av irinotekan. Deras farmakokinetik är oberoende av antalet tidigare cykler och av administreringsschemat.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska data

Intensiteten av de huvudsakliga biverkningarna som uppstår med irinotekan (t.ex. leukoneutropeni och diarré) har samband med exponeringen (AUC) för läkemedlet och metaboliten SN-38. Signifikanta korrelationer observerades mellan hematologisk toxicitet (minskat antal vita blodkroppar och neutrofiler vid lägsta nivån) eller diarréintensitet och AUC-värden för både irinotekan och metaboliten SN-38 vid monoterapi.

Patienter med nedsatt UGT1A1-aktivitet:

Uridindifosfatglukuronyltransferas 1A1 (UGT1A1) deltar i den metabola inaktiveringen av SN-38, den aktiva metaboliten av irinotekan, till inaktiv SN-38-glukuronid (SN-38G). UGT1A1-genen är starkt polymorf, vilket leder till att olika individer har olika metabol kapacitet. De mest välkarakteriserade

genetiska UGT1A1-varianterna är UGT1A1 och UGT1A*6. Dessa varianter och andra medfödda brister i UGT1A1-uttryck (såsom Gilberts syndrom och Crigler-Najjar) är associerade med reducerad aktivitet av detta enzym.

Patienter som är långsamma UGT1A1-metaboliserare (t.ex. homozygota för UGT1A1*28- eller *6-varianter) löper ökad risk för allvarliga biverkningar såsom neutropeni och diarré efter administrering av irinotekan, som en följd av SN-38-ackumulering. Enligt data från flera metaanalyser är risken högre för patienter som får irinotekandoser > 180 mg/m² (se avsnitt 4.4).

För att kunna identifiera patienter med ökad risk för allvarlig neutropeni och diarré, kan UGT1A1-genotypning användas. Homozygot UGT1A1*28 förekommer med en frekvens på 8–20 % i populationerna i Europa, Afrika, Främre orienten och de latinska länderna. *6-varianten saknas nästan helt i dessa populationer. I den östasiatiska populationen är frekvensen av *28/*28 cirka 1–4 %, 3–8 % för *6/*28 och 2–6 % för *6/*6. I den central- och sydasiatiska populationen är frekvensen av *28/*28 cirka 17 %, 4 % för *6/*28 och 0,2 % för *6/*6.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Irinotekan och SN-38 har visats vara mutagena både *in vitro* i kromosomavvikelsestest på CHO-cellér och *in vivo* i mikrokärntest på mus. De har dock inte visat någon mutagenicitet i Ames test.

Hos råttor som behandlades en gång i veckan i 13 veckor med den högsta dosen 150 mg/m² (vilken är mindre än hälften av den rekommenderade dosen till människa) rapporterades inga behandlingsrelaterade tumörer 91 veckor efter avslutad behandling.

Toxicitetsstudier med enkeldos och upprepade doser av irinotekan har genomförts på mus, råtta och hund. De huvudsakliga toxiska effekterna observerades i de hematologiska och lymfatiska systemen. Hos hund rapporterades fördöjd diarré i samband med atrofi och fokal nekros av tarmslemhinnan. Alopeci observerades också hos hund. Dessa effekters svårighetsgrad var dosrelaterad och reversibel.

Reproduktion

Irinotekan var teratogen hos råtta och kanin vid doser som var lägre än den terapeutiska dosen till människa. Ungar till behandlade råtthonor med ytter avvikeler uppvisade nedsatt fertilitet. Detta sågs inte hos morfologiskt normala ungar. Hos dräktiga råttor sågs minskad placentavikt och hos avkomman minskad livsduglighet hos foster och ökade beteendeavvikeler.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälppämmen

Sorbitol (E420)

Mjölkpsyra

Natriumhydroxid (för justering till pH 3,5)

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Utspätt läkemedel (infusionsvätska, lösning)

Efter spädning i 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning har kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning visats i upp till 6 timmar vid rumstemperatur (ca 25 °C) och i omgivningsljus eller 48 timmar om infusionsvätskan förvaras kallt (ca 2 °C – 8 °C).

Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionsvätskan användas omedelbart. Om infusionsvätskan inte används omedelbart, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 6 timmar vid rumstemperatur eller 24 timmar vid 2 °C – 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för utspädd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Irinotecan medac 40 mg:

2 ml injektionsflaska av brunt glas med förslutning av halobutylgummi, klädd med ett lager inert fluorpolymer på insidan. Förpackning med en injektionsflaska.

Irinotecan medac 100 mg:

5 ml injektionsflaska av brunt glas med förslutning av halobutylgummi, klädd med ett lager inert fluorpolymer på insidan. Förpackning med en injektionsflaska.

Irinotecan medac 300 mg:

15 ml injektionsflaska av brunt glas med förslutning av halobutylgummi, klädd med ett lager inert fluorpolymer på insidan. Förpackning med en injektionsflaska.

Irinotecan medac 500 mg:

25 ml injektionsflaska av brunt glas med förslutning av halobutylgummi, klädd med ett lager inert fluorpolymer på insidan. Förpackning med en injektionsflaska.

Irinotecan medac 1 000 mg:

50 ml injektionsflaska av brunt glas med förslutning av halobutylgummi, klädd med ett lager inert fluorpolymer på insidan. Förpackning med en injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Liksom andra antineoplastiska medel måste Irinotecan medac beredas och hanteras med försiktighet. Glasögon, mask och handskar måste användas.

Om Irinotecan medac koncentrat till infusionsvätska eller färdigberedd infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart och noggrant med tvål och vatten. Om Irinotecan medac koncentrat till infusionsvätska eller färdigberedd infusionsvätska kommer i kontakt med slemhinnor, tvätta omedelbart med vatten.

Beredning av intravenös lösning

Liksom alla andra injicerbara läkemedel måste Irinotecan medac infusionsvätska beredas aseptiskt (se avsnitt 6.3).

Om fällning observeras i injektionsflaskorna eller efter spädning, ska produkten kasseras enligt standardrutiner för cytotoxiska medel.

Beräknad mängd Irinotecan medac koncentrat till infusionsvätska dras aseptiskt upp från injektionsflaskan med en kalibrerad spruta och injiceras i en 250 ml infusionspåse eller infusionsflaska innehållande antingen 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning. Infusionsvätskan ska därefter blandas väl genom att infusionspåsen eller infusionsflaskan roteras för hand.

Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala riktlinjer.
Endast för engångsbruk.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

24766

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 01 juli 2009
Datum för den senaste förnyelsen: 05 januari 2018

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

02.02.2023